

مجاز است.

استفاده از:

۱. کدام یک از موارد زیر جزء نشانه های عصب - رفتاری تجربه شده بوسیله افراد دچار آسیب مغزی نمی باشد؟
  - الف. بی قراری
  - ب. سردردها
  - ج. آسیب حافظه ای
  - د. خستگی
۲. نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟
  - الف. ابرامسون
  - ب. سلیگمن
  - ج. آبلا و همکاران
  - د. بک
۳. خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر نتیجه چیست؟
  - الف. یاس و نالمیدی
  - ب. هذیان و توه
  - ج. داروهای مصرفی
  - د. ناآرامی درونی
۴. خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟
  - الف. حساسیت کم
  - ب. تحریک پذیری
  - ج. کم فعالی
  - د. ناآرامی درونی
۵. ویژگی اصلی اختلال شخصیتی اسکیزوفرنی کدام است؟
  - الف. اجتناب از روابط نزدیک
  - ج. کمال گرایی
  - ب. داشتن عقاید انتساب
  - د. تمایل به روابط نزدیک
۶. نام قدیمی شخصیت نمایشی، کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
  - الف. نارسیسم
  - ب. هیستریک
  - ج. سایکوپات
  - د. اسکیزوفرنی
۷. عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می شوند کدامند؟
  - الف. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی
  - ج. والدین سخت گیر
  - ب. وجود والدین بسیار بی تفاوت
  - د. والدین خشن
۸. برای درمان اختلال شخصیت مرزی از چه راهبردی استفاده می شود؟
  - الف. آکاهی هیجانی
  - ب. دارایی
  - ج. شناختی - رفتاری
  - د. زیستی
۹. رایج ترین نوع دماغی در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟
  - الف. آلزایمر
  - ب. پارکینسون
  - ج. صرع
  - د. MS
۱۰. بیشترین درصد مبتلایان به بیماری آلزایمر در چه سنینی هستند؟
  - الف. بالای ۸۵ سال
  - ب. ۶۰ سال
  - ج. بالای ۸۰ سال
  - د. ۸۰ سال
۱۱. یکی از مشکلات مهم هم آیند با بیماری MS چیست؟
  - الف. استرس
  - ب. افسردگی
  - ج. آشفتگی هیجانی
  - د. درماندگی آموخته شده
۱۲. در حملاتی که هوشیاری آسیب می بیند کدام نوع تشنج را مشخص می سازد؟
  - الف. ساده
  - ب. پیچیده
  - ج. محدود
  - د. نوع کلی
۱۳. معروف ترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟
  - الف. فلوکستین
  - ب. ال-دوپا
  - ج. ترازوون
  - د. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

مجاز است.

استفاده از:

۱۴. شایع‌ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

- الف. اختلالات خلقی      ب. اختلالات شخصیتی      ج. افسردگی  
د. اضطراب فراگیر

۱۵. نشانه‌های اصلی اختلال خلقی چیست؟

- الف. شادی بیش از حد      ب. رفتار مانیاگی  
د. افسردگی      ج. غمگینی مفرط

۱۶. سن معمولی برای شروع افسردگی چند سال می‌باشد و بیشتر در میان چه جنسی شایع می‌باشد؟

- الف. ۲۴ و ۲۹، زنان      ب. ۳۹ و ۴۹، مردان

- ج. ۲۰ و ۲۵، به طور مساوی

۱۷. به نظر لوینسون و همکاران علت افسردگی چه چیزی می‌باشد؟

- الف. کاهش تماسهای اجتماعی      ب. پاداش به خاطر رفتارهای افسردگوار

- ج. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت      د. محیط خارج از کنترل شخص

۱۸. میزان خودکشی و مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان چه جنسی بیشتر است؟

- الف. زنان- زنان      ب. مردان- زنان      ج. هر دو مساوی می‌باشند

۱۹. به نظر کراپلین کدام بیماری اغلب در نوجوانی، با دوره‌های طولانی از ناتوانی شدید اجتماعی و کارکرد مشخص می‌شود؟

- الف. اسکیزوفرنی      ب. جنون زودرس      ج. جنون مانیک- دپرسیو  
د. روان گسیختگی

۲۰. به نظر کراپلین کدام مورد از محدودیتها مفهوم جنون زودرس نمی‌باشد؟

الف. هذیان و توهمات شدید مشخصه عود آن می‌باشد.

ب. بیماری محدود به جوانترها نمی‌باشد.

ج. در برخی افراد، بهبودی ایجاد می‌شود.

د. همیشه به زوال عقلی ختم نمی‌شود.

۲۱. میزان کلی خودکشی در اسکیزوفرنیا در حدود چند درصد می‌باشد؟

- الف. ۲ تا ۱۰ درصد      ب. ۵ درصد      ج. ۱۰ درصد      د. ۱۰ درصد

۲۲. عوارض کلریپرومازین که به نشانه‌های خارج هرمی معروف می‌باشند کدام مورد می‌باشد؟

- الف. خشکی دهان و گلو      ب. نشانه‌های پارکینسون و حرکت پریشی دیررس

- ج. آشفتگی بینایی      د. آسیب مهم به سیستم ایمنی مهم

۲۳. اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتاپیال در کدام طبقه از دسته‌بندی **DSM-IV** قرار می‌گیرد؟

- الف. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق

- ج. عجیب و غریب یا نامتعارف

ب. ترسو یا مضطرب

- د. فعل پذیر- پرخاشگر

ج. عجیب و غریب یا نامتعارف

۲۴. کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

- الف. اسکیزوئید      ب. اسکیزوتاپیال      ج. پارانویایی  
د. مرزی

مجاز است.

استفاده از:

۲۵. نام دیگر اختلال شخصیت ضد اجتماعی چه می باشد؟

- الف. نارسیس      ب. هیستریک      ج. اسکیزوفرنی شبه نروتیک      د. سایکوپات

۲۶. کمک به درمانجو جهت کنار آمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی می باشد؟

- الف. روان درمانی      ب. آموزش آکاهی هیجانی

- د. بهبودی مشکلات ارتباطی      ج. رویکرد چند سیستمی مبتنی بر خانواده

۲۷. طبق طبقه بندی DSM-TV چند درصد وزن بدن مبتلا به بی اشتہایی روانی از دست می رود؟

- الف. ۵ تا ۱۰ درصد      ب. ۱۵ درصد      ج. ۱۰ تا ۲۰ درصد

- د. ۱۵ تا ۲۰ درصد

۲۸. کدام گزینه در مورد پراشتہایی روانی صحیح نمی باشد؟

- الف. افراد مبتلا در مورد عدم جذابیت حساس و قرس از چاق شدن دارند

- ب. تلاش‌های آنان برای مقابله با چاقی راحتر از بی اشتہایان روانی است

- ج. دوره‌های پرخوری تکراری

- د. رفتارهای نامناسب جبرانی

۲۹. طبق نظریه زیست شناختی عامل ایجاد احساس گرسنگی چه چیزی می باشد؟

- الف. سطح پایین سر و تونین

- ب. هیپوتالاموس شکمی

- ج. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس

۳۰. کدام مرحله از خواب Non-REM خواب عمیق نامیده می شود؟

- الف. مرحله اول      ب. مرحله دوم و سوم      ج. مرحله سوم و چهارم

۳۱. دور باطل اضطراب- بی خوابی مربوط به کدام از انواع بدخوابی ها می باشد؟

- الف. بی خوابی اولیه

- ج. پرخوابی اولیه

۳۲. بدخوابی و نابهنجاری های همراه خواب ناشی از کدام اختلال خواب می باشد؟

- الف. اختلال مربوط به اختلال روانی دیگر

- ب. اختلالهای اولیه خواب

- ج. اختلال ناشی از یک بیماری جسمانی

- د. اختلال ناشی از مواد

۳۳. وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟

- الف. نارکولپسی      ب. کابوس      ج. آپنه      د. وحشت شبانه



پیام نور-

دانشجویان  
پایگاه خبری

**PNUNA.COM**  
PNU News Agency

روش تحقیلی/ کد درس: روانشناسی سنتی(۱۲۱۷۰۲۹)- روان شناسی تجمیع(۱۲۱۷۰۶۱)- علوم تربیتی تجمیع

تعداد سوالات: تست: ۴۰ تشرییع: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحقیلی/ کد درس: روانشناسی سنتی(۱۲۱۷۰۲۹)- روان شناسی تجمیع(۱۲۱۷۰۶۱)- علوم تربیتی تجمیع

مجاز است.

استفاده از:

۳۴. در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال هویت جنسی، از کدام یک از روشهای روان درمانی استفاده نمی‌شود؟

الف. جلسات آموزش رفتارهای مربوط به هویت جنسی واقعی

ب. آموزش والدین

ج. استفاده از برنامه‌های رفتاری جهت تقویت رفتارهای مربوط به جنس واقعی

د. روان تحلیلگری

۳۵. کدام مورد از اختلالات بدکاری جنسی از نظر جامعه مضر و نامناسب شمرده می‌شود؟

الف. پارافیلیاها      ب. اختلال ناشی از مواد      ج. اختلال تحريك جنسی      د. اختلال مربوط به درد جنسی

۳۶. بهترین درمان مبدل پوشی کدام مورد می‌باشد؟

الف. روان درمانی

ج. خانواده درمانی

۳۷. آشفتگی زبانی شامل کدام یک از ویژگیهای آزالزایمر می‌باشد؟

الف. آمنزی      ب. آپراکسی      ج. آفازی      د. آکنوزیا

۳۸. شروع MS به شکل بدخیم از چه سنی می‌باشد؟

الف. قبل از ۵۰ سالگی      ب. ۴۰ سالگی      ج. ۳۰ - ۴۰ سالگی

۳۹. اولین اختلال شایع عصب شناختی کدام مورد می‌باشد؟

الف. صرع      ب. صدمات سر      ج. سکته

د. پارکینسون

۴۰. ضایعات در کدام قسمت مغز ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهمندی شناوی می‌شود؟

الف. لوپ تمپورال نیمکره چپ

ج. پرده لوپ فرونال

ب. لوپ تمپورال طرف راست

د. بطن‌های مغزی