

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمار استنباطی، آمار استنباطی

و شته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی (چندبخشی، روانشناسی عمومی، روانشناسی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۰۵ - آموزش محیط‌زیست)
۱۲۴۰۰۲۲

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- ۱- کدام مورد صحیح است؟

۱. اگر هر قدر تعداد آزمایش کمتر باشد، احتمال تقریب بیشتر است.

۲. احتمال شیر یا خط آمدن در پرتاب سکه ۰/۷۵ است.

۳. اگر تعداد آزمایشات به سمت بی نهایت برود تفاضل احتمال نظری و تجربی به صفر نزدیکتر می‌شود.

۴. احتمال آمدن عدد ۳ در پرتاب یک تاس برابر است با $\frac{3}{6}$

- ۲- در صورتیکه بدانیم از ۸ مهره قرمز رنگ ۳ تای آن فلزی و از ۷ مهره آبی رنگ ۲ تای آن فلزی و بقیه مهره‌ها چوبی هستند، احتمال پیشامد چوبی یا آبی برابر است با:

$$\frac{10}{15} . ۴$$

$$\frac{5}{15} . ۳$$

$$\frac{7}{15} . ۲$$

$$\frac{12}{15} . ۱$$

- ۳- به نظر شما از بین هشت نفر بازیکن شطرنج چند تیم چهار نفری می‌توان تشکیل داد؟

$$۷۰ . ۴$$

$$۴۵ . ۳$$

$$۵۶ . ۲$$

$$۲۴ . ۱$$

- ۴- با عنایت به فرمول توزیع دو جمله‌ای، احتمال روشندن ۵ شیر را در ۷ پرتاب برابر است با:

$$\frac{42}{64} . ۴$$

$$\frac{21}{128} . ۳$$

$$\frac{21}{64} . ۲$$

$$\frac{42}{128} . ۱$$

- ۵- در کدام حالت منحنی توزیع دو جمله‌ای کجی منفی دارد؟

$$n = \infty . ۴$$

$$p > q . ۳$$

$$p < q . ۲$$

$$p = q . ۱$$

- ۶- در کدام روش نمونه گیری انتخاب هر عضو مستقل از سایر اعضا نیست؟

$$۴. خوش‌های$$

$$۳. تصادفی طبقه‌ای$$

$$۲. تصادفی منظم$$

$$۱. تصادفی$$

- ۷- اگر در یک نمونه ۶۴ نفری خطای استاندارد میانگین برابر یک شود انحراف استاندارد کدام گزینه زیر خواهد شد؟

$$۶۴ . ۴$$

$$۱ . ۳$$

$$۴ . ۲$$

$$۸ . ۱$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمار استنباطی، آمار استنباطی

و شته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی، روانشناسی عمومی (روانشناسی چندبخشی) ۱۱۱۷۰۰۵ - آموزش محیط‌زیست ۱۲۴۰۰۲

۸- فرض خلاف در کدام گزینه آمده است؟

۱. بین میانگین محاسبه شده نمونه اول با میانگین نمونه دوم تفاوتی وجود ندارد.
۲. تفاوت معنی داری بین دو متغیر از لحاظ آماری وجود ندارد.
۳. تفاوت‌های مشاهده شده بین دو متغیر ناشی از خطای نمونه گیری می‌باشد.
۴. بین میانگین محاسبه شده نمونه با میانگین جامعه تفاوت وجود دارد.

۹- هرچه حجم نمونه افزایش یابد:

۱. ارتکاب به خطای نوع اول کمتر می‌شود.
۲. احتمال خطای نوع دوم بیشتر خواهد شد.

۱۰- اگر فرضیه پژوهشگر جهت دار باشد بنابراین:

۱. فرض خلاف یک دامنه است.
۲. فرض صفر نیز جهت دار خواهد شد.
۳. فرض پژوهش دو دامنه می‌باشد.
۴. تصمیم درباره جهت دار یا بدون جهت بودن فرضیه نامشخص است.

۱۱- شکل توزیع طبیعی به کدام عامل بستگی دارد؟

۱. میانگین و انحراف استاندارد
۲. میانگین
۳. حجم نمونه
۴. انحراف استاندارد

۱۲- در منحنی طبیعی Z سطح سمت چپ یک نمره خاص، چه چیزی را نشان می‌دهد؟

۱. فراوانی نسبی تراکمی نمره
۲. فراوانی نمره
۳. سطح میانگین نمره
۴. هرسه مورد

۱۳- کدام مورد صحیح نیست؟

۱. هرچه حجم نمونه ها بیشتر باشد خطای استاندارد میانگین کوچکتر است.
۲. هرچه حجم نمونه ها بیشتر باشد خطای نمونه گیری بیشتر می‌شود.
۳. هرچه حجم نمونه ها بیشتر باشد توزیع میانگین های نمونه ها به توزیع طبیعی نزدیکتر می‌شود.
۴. خطای استاندارد میانگین؛ همان انحراف استاندارد توزیع میانگین های نمونه ها است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمار استنباطی، آمار استنباطی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

و شته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی (چندبخشی، روانشناسی عمومی)، روانشناسی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۰۵ - آموزش محیط‌زیست ۱۲۴۰۰۲۲

۱۴- اگر در بین ۳۶ نفر انحراف استاندارد برابر ۱۲ و میانگین قد ۱۴۰ سانتیمتر باشد میانگین واقعی جامعه را در سطح الفا برابر با $\beta = 0.05$ برآورد کنید:

۱۴۳/۹۲-۱۳۶/۰۸ . ۴

۱۴۲/۵۸-۱۳۷/۴۲ . ۳

۱۴۱/۹۶-۱۳۸/۰۴ . ۲

۱۳۶/۹۲ - ۱۴۳/۵۸ . ۱

۱۵- در کدام درجه آزادی زیر شکل t به Z نزدیکتر و شبیه تر است؟

۶۰ . ۴

۱۰ . ۳

۱۱۰ . ۲

۲۵ . ۱

۱۶- چنانچه خطای استاندارد میانگین ۲۵ نفر دانشجو برابر ۳ باشد و میانگین هوشیار آنان ۱۲۵ شود مقدار t حاصله از تفاوت میانگین نمونه مورد نظر را با میانگین جامعه دانشجویان با میانگین ۱۲۰ و انحراف استاندارد ۱۵ برابر کدام گزینه زیر است؟

۲/۱۶ . ۴

۱/۶۶ . ۳

۲/۵۸ . ۲

۱/۹۶ . ۱

۱۷- اگر بخواهیم تفاوت میانگین نمرات بین دو گروه دانشجویی شهرستانی و تهرانی را مقایسه کنیم کدام روش زیر را پیشنهاد می‌کنید؟

t . ۴ . مستقل

t . ۳ . همبسته

Z . ۲

۱. t تک نمونه

۱۸- در صورتیکه مقدار t حاصله در دو گروه ده نفری که با یکدیگر همتراز شده اند برابر ۲/۱۷ باشد با استفاده از جدول t (دو دامنه 0.05) کدام نتیجه زیر صحیح می‌باشد؟

۲. تفاوت ملاحظه شده شانسی است.

۱. فرض صفر رد شود.

۴. فرض پژوهش تائید می‌شود.

۳. تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد.

۱۹- واریانس کل در جدول زیر کدام گزینه است؟

| A | B | C |
|----|----|----|
| ۱۶ | ۱۰ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۰ | ۶ |
| ۱۲ | ۱۰ | ۸ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸ | ۱۰ | ۱۲ |

۱۲۰ . ۴

۸۱ . ۳

۱۲۴ . ۲

۹۶ . ۱

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمار استنباطی، آمار استنباطی

و شته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی (چندبخشی، روانشناسی عمومی)، روانشناسی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۰۵ - آموزش محیط‌زیست ۱۲۴۰۰۲۲

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

۲۰- واریانس خطای جدول سوال قبل برابر کدام گزینه است؟

۹. ۴ ۱۶. ۳ ۹۶. ۲ ۵۴. ۱

۲۱- میانگین مجددات بین گروهی در جدول سوال ۱۰ برابر کدام گزینه زیر است؟

۸. ۴ ۱۶. ۳ ۵۴. ۲ ۲۰. ۱

۲۲- با توجه به میزان f حاصله از جدول سوال ۱۰ و مقایسه آن با f (جدول پیوست) کدام نتیجه صحیح است؟

۱. مدارک کافی برای رد فرض صفر در اختیار نیست.
۲. تفاوت ملاحظه شده از لحاظ آماری معنی دار است.
۳. تفاوت بین سه گروه تصادفی و شناسی است.
۴. فرض پژوهش تایید نمی شود.

۲۳- چنانچه مقدار f در سه گروه چهار نفری برابر ۵ و میانگین مجموع مجددات بین گروهی برابر ۱۵ باشد مجموع مجددات درون گروهی برابر کدام گزینه زیر است؟

۳. ۱ ۹. ۲ ۱۲. ۳ ۲۷. ۴

۲۴- اگر در سه گروه پنج نفری میانگین مجددات درون گروهی برابر ۱۰ باشد، خطای معیار آماره چند می شود؟

۲. ۴ ۰/۶۶. ۳ ۱/۴۱. ۲ ۰/۸۱. ۱

۲۵- پژوهشگری علاقه مند است نگرش افراد را به مساله ازدواج بررسی نماید لذا آنها را در سه گروه مخالف بی تفاوت و موافق دسته بندی می نماید کدام روش آماری را برای او مناسب می دانید؟

۱. تحلیل واریانس ۲. خی دو ۳. توکی ۴. شفه

۲۶- اطلاعات قبلی نشان می دهد که قبولی پسران به دختران در کنکور ریاضی ۷۰ به ۳۰ است لذا محققی از بین ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی ملاحظه کرد که ۱۲۰ نفر پسر و ۸۰ نفر دختر پذیرفته شده اند فراوانی مورد انتظار پسران برابر کدام گزینه زیر است؟

۱. ۱۲۰ نفر ۲. ۶۰ نفر ۳. ۱۳۰ نفر ۴. ۱۴۰ نفر

۲۷- آزمون نیکویی برآش برای جدول زیر برابر است با:

| بیوہ | مطلقه | متاهل | مجرد |
|------|-------|-------|------|
| ۱۰ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۰ |

۱. ۰/۸ ۲. ۲/۷ ۳. ۱/۵ ۴. ۲/۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۱۲۰ قسطی: ۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسطی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمار استنباطی، آمار استنباطی

و شته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی (چندبخشی، روانشناسی عمومی)، روانشناسی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۰۵ - آموزش محیط‌زیست ۱۲۴۰۰۲۲

- ۲۸- در مواقعی که درجات آزادی در آزمون خی دو برابر یک است:

- ۱. منحنی نمونه گیری نرمال می‌شود.
- ۲. باید از آزمونهای پارامتریک استفاده شود.
- ۳. شایسته است سطوح با هم ادغام شود.

- ۲۹- در بین ۲۰۰ نفر فراوانی مورد انتظار خانه‌ای به حجم ۳۰ نفر که مجموع سطر و ستون آن به ترتیب برابر ۲۰۰ و ۳۰ می‌باشد برابر کدام گزینه زیر است:

۷۰ . ۴ ۴۵ . ۳ ۳۰ . ۲ ۲۰ . ۱

- ۳۰- در جدول توافقی 2×2 زیر میزان مجذور خی چند می‌شود؟

| | |
|---|---|
| ۳ | ۷ |
| ۸ | ۲ |

۲/۷۱ . ۴ ۳/۲۳ . ۳ ۱/۱۸ . ۲ ۲/۰۹ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمار استنباطی، آمار استنباطی

و شته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی (چندبخشی، روانشناسی عمومی)، روانشناسی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۰۵ - آموزش محیط‌زیست

۱۲۴۰۰۲۲

$$\rho(A \cup B) = \rho_{(A)} + \rho_{(B)} \quad \mu = n.p \quad \rho_{(A \cup B)} = \rho_{(A)} + \rho_{(B)} - \rho_{(A \cap B)}$$

$$\sigma^2 = n.p.q \quad F = \frac{MSb}{MSw} \quad \rho_{(A,B)} = \rho_A \times \rho_{(B|A)}$$

$$S_{\bar{X}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \quad MSb = \frac{ssb}{df.b} \quad \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} \quad S_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$m \text{احتمال} f(x) = \binom{n}{x} \rho^x q^{n-x} \quad z = \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}} \quad SS_t = \sum \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}$$

$$\bar{X} \pm z(s_{\bar{X}}) \quad St = \sqrt{\frac{df}{df-1}} \quad SS_t = SS_b + SS_w$$

$$SS_b = \frac{(\sum X_1)^2}{n_1} + \frac{(\sum X_p)^2}{n_p} + \frac{(\sum X_\varphi)^2}{n_\varphi} + \dots - \frac{(\sum \sum X)^2}{N} \quad t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{N}}}$$

$$t = \frac{\frac{\sum d}{n}}{\sqrt{\frac{\sum d^2 - (\sum d)^2}{n(n-1)}}} \quad SS_w = SS_t - SS_b \quad tukey = \frac{k(k-1)}{p}$$

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_p}{\sqrt{\left(\frac{\sum X_1^2 - (\sum X_1)^2}{n_1} + \sum X_p^2 - \frac{(\sum X_p)^2}{n_p} \right) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_p} \right)}} \quad l_s = \sqrt{\frac{MSw}{n}}$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(o-e)^2}{e}, \quad \chi^2 = \sum \frac{(|o-e|-0.5)^2}{e}, \quad l = \frac{(\sum r)(\sum c)}{N}, \quad l = \frac{N}{k}$$

$$\chi^2 = \frac{(|ad - bc| - \frac{n}{r})^2 n}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} \quad MSw = \frac{SSw}{df.w}$$