



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (PNU News)

چندبخشی (۱۲۱۷۰۶۱)

۱- نوسانات خلقی بیماران مبتلاء به اختلالات خلقی معمولاً با کدام دارو درمان می شود؟

۱. فلوکستین      ۲. ایمی پرامین      ۳. ال دوپا      ۴. لیتیوم

۲- DSM-IV کدام نوع افسرگی را افسردگی همراه با مالیخولیا می نامد؟

۱. افسردگی برون زاد      ۲. افسردگی درون زاد      ۳. افسردگی اساسی      ۴. افسردگی مضاعف

۳- مهمترین ناحیه مغزی دخیل در افسردگی کدام ناحیه است؟

۱. لیمبیک      ۲. تalamوس      ۳. قشر مغز      ۴. هیپوکامپ

۴- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. ابرامسون      ۲. سلیگمن      ۳. بک      ۴. آبلا و همکاران

۵- کدام یک از داروهای زیر جزو سه حلقوی ها نمی باشد؟

۱. فلوکستین      ۲. آمی تریپتیلن      ۳. دسی پرامین      ۴. ایمی پرامین

۶- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۱. یأس و نامیدی      ۲. هذیان و توهمندی      ۳. داروهای مصرفی      ۴. ناآرامی درونی

۷- تبیین های سبب شناسی اختلال عاطفی فصلی عمدتاً بر چه اساسی قرار گرفته اند؟

۱. روان شناختی      ۲. زیست شناختی      ۳. شناختی      ۴. روان تحلیل گری

۸- خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟

۱. حساسیت کم      ۲. تحریک پذیری      ۳. کم فعالی      ۴. نامیدی

۹- افراد مبتلا به اختلال ادواری خوبی شدیداً در معرض خطر ابتلا به کدام اختلال قرار دارند؟

۱. اختلال دوقطبی      ۲. اختلال افسردگی خوبی      ۳. اختلال دوقطبی

۴. افسردگی اساسی

۱۰- شدیدترین اختلال روانی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. افسردگی      ۲. اختلال دوقطبی      ۳. اسکیزوفرنی      ۴. اختلال شخصیت پارانوئید



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۱)

**۱۱- شایع ترین نشانه اسکیزوفرنی حاد مربوط به کدام نشانه است؟**

۱. فقدان بینش      ۲. اختلالات گفتاری      ۳. توهمات دیداری      ۴. عاطفه بی حالت

**۱۲- بر اساس ملاک های تشخیص DSM-IV-TR نشانه های اسکیزوفرنیا در چه مدت قابل تشخیص می باشد؟**

۱. ۶ هفته      ۲. ۱ ماه      ۳. ۲ ماه      ۴. ۲ هفته

**۱۳- کدامیک از نروترانسمیترهای زیر در اسکیزوفرنیا نقش عمده ای دارد؟**

۱. سروتونین      ۲. استیل کولین      ۳. اپی نفرین      ۴. دوپامین

**۱۴- مصرف کدام یک از مواد زیر خطر ابتلاء به اسکیزوفرنی را افزایش می دهد؟**

۱. آمفاتامین      ۲. هروئین      ۳. حشیش      ۴. کوکائین

**۱۵- کدام درمان زیر امروزه برای درمان اسکیزوفرنی کاربرد ندارد؟**

۱. کلرپرمازین      ۲. الکترو شوک درمانی      ۳. کلوزاپین      ۴. هالوپریدول

**۱۶- کدام یک از موارد زیر، در اسکیزوفرنیا دارو درمانی را بهبود می بخشد؟**

۱. مدیریت استرس      ۲. تغییر باورها      ۳. خانواده درمانی      ۴. چالش کلامی

**۱۷- شروع بیماری اسکیزوفرنیا مشخصاً بین چه سنینی صورت می گیرد؟**

۱. ۲۰-۲۸ سالگی      ۲. ۲۰-۳۹ سالگی      ۳. ۲۰-۳۶ سالگی      ۴. ۱۸-۳۹ سالگی

**۱۸- کدام اختلال های شخصیتی در مردان بیشتر است؟**

۱. ضداجتماعی و خودشیفته      ۲. نمایشی و مرزی

۳. ضداجتماعی و مرزی      ۴. نمایشی و خودشیفته

**۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟**

۱. احساس خالی بودن      ۲. فرار از روابط نزدیک      ۳. آشفتگی هویت      ۴. خودآسیب زنی عمدی

**۲۰- بک و همکاران در تبیین شان از اختلالات شخصیت چه نظرگاهی اتخاذ کرده اند؟**

۱. روان تحلیل گری      ۲. زیستی      ۳. ژنتیکی      ۴. تکاملی

**۲۱- نام قدیم شخصیت نمایشی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟**

۱. نارسیسم      ۲. اسکیزوفرنی      ۳. سایکوپات      ۴. هیستریک



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۱)

-۲۲- در کدام یک از اختلالات زیر تفکر خودکشی و تلاش هایی برای خودکشی رایج است؟

- ۲. اختلال شخصیت مرزی
- ۴. خودشیفته
- ۳. اختلال ضداجتماعی
- ۱. اختلال پارانویا

-۲۳- کدام یک از اختلال های شخصیتی زیر با خصوصیات شخصیتی تیپ A مطابقت می کند؟

- ۴. منفعل- پرخاشگر
- ۳. دوری گزین
- ۲. وابسته
- ۱. وسواسی- جبری

-۲۴- بر اساس نظام DSM-IV سن تشخیص اختلالات شخصیت چه سنی است؟

- ۴. ۲۵ سالگی
- ۳. ۲۲ سالگی
- ۲. ۱۸ سالگی
- ۱. ۱۴ سالگی

-۲۵- بر اساس مدل پنج عاملی مکره، کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال شخصیت ضداجتماعی مطرح شده است؟

- ۴. علاقه به تنها یابی
- ۳. کمال گرایی
- ۲. برون گرایی پایین
- ۱. روان رنجور خوبی بالا

-۲۶- اصطلاح بی اشتہایی روانی توسط چه کسی و در چه سالی وارد قلمرو پزشکی شد؟

- ۴. کراپلین ۱۸۲۴
- ۳. فروید ۱۸۷۴
- ۲. گول ۱۸۹۴
- ۱. مورتن ۱۶۹۴

-۲۷- در بین مبتلایان به بی اشتہایی پرخوری - پاکسازی کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟

- ۴. اختلال دوقطبی
- ۳. تمارض
- ۲. اختلال کمبود توجه
- ۱. سوءصرف مواد

-۲۸- نظریه نقطه ثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟

- ۴. هیپوفیز
- ۳. هیپوکامپ
- ۲. هیپوتalamus
- ۱. تalamus

-۲۹- چند درصد از واریانس رفتارهای بی اشتہایی را می توان به عوامل ژنتیکی نسبت داد؟

- ۴.٪۷۵
- ۳.٪۶۵
- ۲.٪۵۵
- ۱.٪۴۵

-۳۰- کدامیک از داروهای زیر برای هر دو اختلال های تغذیه ای سودمند است؟

- ۴. داروهای ضداستفراغ
- ۳. داروهای ضداضطراب
- ۲. داروهای ضدجنون
- ۱. داروهای ضدافسردگی

-۳۱- طبق برخی نظریه ها کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

- ۴. مرحله چهارم
- ۳. مرحله سوم
- ۲. مرحله دوم
- ۱. REM

-۳۲- کابوس در کدام مرحله خواب روی می دهد؟

- ۴. مرحله دوم
- ۳. مرحله اول
- ۲. REM
- ۱. non-REM



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۱)

-۳۳- اصلی ترین ملاک تشخیص نارکولوپسی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- ۱. بیخوابی غیرقابل کنترل در شب
- ۲. تجربه کاتاپلکسی (خشک زدگی)
- ۳. حملات غیرقابل کنترل خواب در طول روز
- ۴. توهمات هپناگوژیک

-۳۴- کدام اختلال نشانگر فعل شدن دستگاه های فیزیولوژیکی در حین خواب است؟

- ۱. اختلال پرخوابی
- ۲. دیس سومینا
- ۳. اختلال اولیه خواب
- ۴. پاراسومیناها

-۳۵- مرحله اول جراحی اختلال هویت جنسی شامل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- ۱. تزریق هورمون جنس مقابل
- ۲. روان درمان متمن کر به تغییر
- ۳. تزریق تسترون
- ۴. پروژسترون

-۳۶- در سبب شناسی روان تحلیلی یادگارخواهی جنسی همراه با مبدل پوشی، کدام مکانیسم دفاعی قابل مشاهده است؟

- ۱. جابجایی
- ۲. واکنش وارونه
- ۳. برگشت
- ۴. فرافکنی

-۳۷- رایج ترین نوع دماسن، در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟

- ۱. صرع
- ۲. آزالیم
- ۳. پارکینسون (نمودن)
- ۴. MS

-۳۸- رایجترین یافته در مغز بیماران صرعی چیست؟

- ۱. تجمع دوطرفه نرون های CA لایه پیرامیدال هیپوکامپ
- ۲. فقدان دو طرفه نرون های CA لایه پیرامیدال هیپوکامپ
- ۳. تجمع دوطرفه نرون های نیمکره های مغزی
- ۴. فقدان دو طرفه نرون های نیمکره های مغزی

-۳۹- بیماری پارکینسون معمولاً در بین چه سنینی شروع می شود؟

- ۱. ۴۰-۷۰ سالگی
- ۲. ۳۰-۶۰ سالگی
- ۳. ۵۰-۸۰ سالگی
- ۴. ۶۰-۹۰ سالگی

-۴۰- صدمات سری که در آن جمجمه یا بافت مغزی فرد آسیب می بیند چه نامیده می شود؟

- ۱. صدمات بسته
- ۲. ضربات مغزی بسته
- ۳. آسیب مغزی
- ۴. صدمات باز