

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گسسته، مبانی ترکیبیات

و شنیده تحصیلی / گد درس: ریاضی (کاربردی)، ریاضی (محض) ۱۱۱۱۰۵۹ -، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۵ -، ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۴۵۷

- ۱- گردایه ای مرکب از ۲ توب قرمز یکسان، ۳ توب زرد یکسان و ۲ توب آبی یکسان را در نظر بگیرید. به چند طریق می توان این ۷ توب را در ۹ سبد به شماره های ۱ تا ۹ قرار داد به طوری که در هر سبد حداقل یک توب قرار داده شود؟

$$\frac{P(9,7)}{2!3!2!7!} \cdot 4$$

$$P(9,7) \cdot 3$$

$$\frac{C(9,7)}{2!3!2!} \cdot 2$$

$$\frac{P(9,7)}{2!3!2!} \cdot 1$$

- ۴- کدام رابطه همواره صحیح است؟

$$C(n,r) = C(n-1,r) \cdot 2$$

$$C(n,r) = C(n-1,n-r) \cdot 1$$

$$C(n,r) = C(n-1,r) + C(n,r-1) \cdot 4$$

$$C(n,r) = C(n-1,r) + C(n-1,r-1) \cdot 3$$

- ۳- ضریب $x^4 y^6$ در بسط $(4x+6y)^5$ برابر است با:

$$C(5;2,3) \cdot 4$$

$$4^3 6^2 C(5;3,2) \cdot 3$$

$$4^2 6^3 C(5;2,3) \cdot 2$$

$$p(5;2,3) \cdot 1$$

- ۴- تعداد جوابهای معادله $x+y+z=12$ ، $x \geq 1, y \geq 2, z \geq 3$ برابر است با

$$C(14,2) \cdot 4$$

$$C(12,3) \cdot 3$$

$$56 \cdot 2$$

$$28 \cdot 1$$

- ۵- حداقل چند عدد صحیح نامنفی انتخاب کنیم که مطمئن باشیم باقیمانده حداقل ۲ عدد از آنها بر n با هم برابر است؟

$$n+1 \cdot 4$$

$$n \cdot 3$$

$$n-1 \cdot 2$$

$$n+2 \cdot 1$$

- ۶- به چند طریق می توان ۷ توب در ۷ رنگ رادر ۴ سبد با شماره های مختلف طوری قرار داد که هیچ سبدی خالی نماند؟

$$C(7,4) \cdot 4$$

$$4!S(7,4) \cdot 3$$

$$4!C(7,4) \cdot 2$$

$$\left[\begin{matrix} 7 \\ 4 \end{matrix} \right] \cdot 1$$

- ۷- تابع مولد معمولی متناظر با دنباله $\{0,1,2,3,4,\dots\}$ کدام است؟

$$\frac{x}{1-x} \cdot 4$$

$$\frac{-x}{(1-x)^3} \cdot 3$$

$$\frac{x}{(1-x)^2} \cdot 2$$

$$\frac{1}{(1-x)^4} \cdot 1$$

- ۸- ضریب x^8 در $(x^4+x^5+\dots)^5$ برابر است با

$$C(33,5) \cdot 4$$

$$C(32,4) \cdot 3$$

$$C(13,5) \cdot 2$$

$$C(12,4) \cdot 1$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گستته، مبانی ترکیبیات

و شه تحصیلی / گد درس: ریاضی (کاربردی)، ریاضی (محض) ۱۱۱۰۵۹ -، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۵ -، ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۴۵۷۶ -

-۹- تعداد اعداد صحیح و مثبت کوچکتر از ۶۰ که نسبت به ۶۰ اول باشند، برابر است با:

۱۶. ۴

۱۵. ۳

۳۰. ۲

۱۰. ۱

$$-10 \quad \text{جواب رابطه بازگشتی} \begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 1 \\ a_1 = 1 \end{cases} \text{ برابر است با}$$

$$a_n = 2^{n+1} - 1 \quad .4$$

$$a_n = 2^{n+1} \quad .3$$

$$a_n = 2^n - 1 \quad .2$$

$$a_n = 2^{n+1} + 1 \quad .1$$

-11- معادله مشخصه یک رابطه بازگشتی به صورت $(x^r + 1)(x - 1)^n$ به دست آمده است، جواب عمومی این معادله کدام گزینه است؟

$$A(i)^n + B(-i)^n + (C + Dn) \quad .2$$

$$A(i)^n + B(-i)^n + C \quad .1$$

$$(i)^n + (-i)^n + (C + Dn) \quad .4$$

$$A(i)^n + B(-i)^n + (C + Dn + En^r) \quad .3$$

$$-12 \quad \text{اگر } n \geq 0 \text{ آنگاه برای } g(x) = \frac{1-2x}{(1-x)(1-3x)} \text{ داریم}$$

$$a_n = \frac{3^n + 1}{2} \quad .4$$

$$a_n = 3^n + 1 \quad .3$$

$$a_n = \frac{3^n - 1}{2} \quad .2$$

$$a_n = \frac{3^n}{2} \quad .1$$

-13- کدام گزینه صحیح است؟

۱. در هر گراف، تعداد رئوس درجه فرد زوج است.

۲. در هر گراف، مجموع درجه رئوس فرد با مجموع درجه رئوس زوج برابر است.

۳. مجموع درجه رئوس فرد یک گراف می تواند فرد هم باشد.

۴. گراف ۳ منظمی با ۵ رأس وجود دارد.

-14- کدام گزینه صحیح است؟

۱. گراف ساده بدون دور را درخت می نامیم.

۲. در گراف K_n درجه هر رأس برابر n است.

۳. در هر گراف G با ماتریس مجاورت A درایه (i,i) درجه رأس v_i در G است.

۴. گراف با حداقل ۲ رأس دو بخشی است اگر و تنها اگر دور فرد نداشته باشد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گسسته، مبانی ترکیبیات

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضی (کاربردی)، ریاضی (محض) ۱۱۱۰۵۹ -، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۵ -، ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۴۵۷

-۱۵ کدام یک از گشت‌های زیر می‌تواند یک مسیر باشد؟

$$v_2e_4v_5e_3v_6e_4v_2e_5v_1 \quad .\cdot 2$$

$$v_4e_5v_5e_4v_3e_1v_2e_5v_1 \quad .\cdot 1$$

$$v_3e_4v_5e_3v_6e_1v_2e_5v_1 \quad .\cdot 4$$

$$v_3e_4v_2e_3v_6e_1v_2e_4v_1 \quad .\cdot 3$$

-۱۶ ماتریس مجاورت گراف G به صورت روبرو است، تعداد (v_2, v_4) گشت‌های به طول ۴ در G برابر چند است؟

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

۱۶. ۴

۸. ۳

۳. صفر

۶۴. ۱

-۱۷ فرض کنید B یک جبر بول و $x, y, z \in B$ در این صورت کدام گزینه صحیح است؟

$$(x + xy)' = x' + x'y' \quad .\cdot 2$$

$$y = x' \quad \text{اگر } x + y = 1 \quad \text{می‌توان نتیجه گرفت}$$

$$y = z \quad xy = xz \quad \text{اگر } \text{می‌توان نتیجه گرفت} \quad .\cdot 4$$

$$x(x + y) = x \quad .\cdot 3$$

-۱۸ کدام گزینه با سایر گزینه‌ها معادل نیست؟

$$xy' = 0 \quad .\cdot 4$$

$$xy = 1 \quad .\cdot 3$$

$$x' + y = 1 \quad .\cdot 2$$

$$x + y = y \quad .\cdot 1$$

-۱۹ صورت نرمال فصلی عبارت بولی $\alpha = x(y'z)'$ برابر کدام گزینه است؟


$$\sum \min^r(4, 6, 7) \quad .\cdot 4$$

$$\sum \min^r(5, 6, 7) \quad .\cdot 3$$

$$\sum \min^r(4, 5, 6) \quad .\cdot 2$$

$$\sum \min^r(4, 5, 7) \quad .\cdot 1$$

-۲۰ نمودار زیر معرف کدام جبر بول است؟



$$B_4 \quad .\cdot 4$$

$$D_3 \quad .\cdot 3$$

$$D_5 \quad .\cdot 2$$

$$B_7 \quad .\cdot 1$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضیات گسسته، مبانی ترکیبیات

و شه تحصیلی / گد درس: ریاضی (کاربردی)، ریاضی (محض) ۱۱۱۰۵۹ -، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۵ -، ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۴۵۷۷ -

سوالات تشریحی

- به چند طریق می توانیم اعداد ۱ تا ۹ را در یک ردیف چنان مرتب کنیم که هیچ کدام از قطعه های ۱۲، ۵۶ و ۷۸ مشاهده نشود؟ نمره ۱.۴۰

- در کیسه ای تعداد زیادی مهره به رنگهای قرمز، آبی و زرد وجود دارد. به چند طریق می توان ۱۰ مهره از این مهره ها را انتخاب کرد که در هر انتخاب از هر رنگ حداقل یک مهره و حداقل ۴ مهره موجود باشد؟ نمره ۱.۴۰

- رابطه بازگشتی غیر همگن زیر را با استفاده از تابع مشخصه حل کنید نمره ۱.۴۰

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + n & , n \geq 2 \\ a_0 = a_1 = 1 & \end{cases}$$

- فرض کنید G یک گراف دوبخشی است. نشان دهید می توان رئوس G را طوری شماره گذاری کرد که ماتریس مجاورت آن به صورت زیر درآید: نمره ۱.۴۰

$$\begin{pmatrix} \circ & B \\ B^t & \circ \end{pmatrix}$$

که در آن B^t ترانهاده B و \circ ماتریس صفر است.

- صورت های نرمال فصلی و عطفی عبارت بولی $\alpha = xy + x'z$ را که روی سه متغیر است بیابید. نمره ۱.۴۰