

سوی سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵



پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

عنوان درس: ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی

رشه تحصیلی / کد درس: ۱۱۱۱۰۹۵-۱۱۱۱۴۱۱

۱۱۱۱۰۹۵-۱۱۱۱۴۱۱

-۱ حاصل عدد $(-1+i)^{500}$ کدام است؟

$$2^{250} \cdot 4$$

$$2^{500}(1-i) \cdot 3$$

$$-2^{250} \cdot 2$$

$$2^{500}(i-1) \cdot 1$$

-۲ معادله $\operatorname{Re} z^2 = 0$ چه شکلی را نشان می دهد؟

۴. دو خط راست

۳. هذلولی

۲. بیضی

۱. دایره

-۳ معادله $(z+i)^n = (z-i)^n$ در اعداد مختلط چند ریشه دارد؟

$$2n \cdot 4$$

$$n-1 \cdot 3$$

$$n+1 \cdot 2$$

$$n \cdot 1$$

-۴ تابع $f(z) = \bar{z}^2$ در چه نقاطی مشتق پذیر است؟

۲. فقط در مبدأ مشتق پذیر است.

۱. در هیچ نقطه‌ای مشتق پذیر نیست.

۴. تابع تمام است.

۳. در همه نقاط بجز مبدأ مشتق پذیر است.

-۵ کدام گزینه نمی‌تواند قسمت حقیقی یا موهومی تابع تحلیلی $f(z) = u + iv$ باشد؟

$$x^2 - y^2 \cdot 4$$

$$x^2 + y^2 \cdot 3$$

$$x - y \cdot 2$$

$$x + y \cdot 1$$

-۶ تصویر خط $x = e^z$ تحت تابع $w = e^z$ کدام است؟

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{4} \cdot 4$$

$$u^2 + v^2 = e^2 \cdot 3$$

$$u^2 + v^2 = 4 \cdot 2$$

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{e^2} \cdot 1$$

-۷ کدام گزینه صحیح است؟

$$\sinh z = i \sin(iz) \cdot 4$$

$$\cosh z = -i \cos(iz) \cdot 3$$

$$\cosh z = i \cos(iz) \cdot 2$$

$$\sinh z = -i \sin(iz) \cdot 1$$

-۸ تابع $f(z) = \csc hz$ در چه نقاطی تحلیلی نیست؟

$$z_k = k\pi i \cdot 4$$

$$z_k = k\pi \cdot 3$$

$$z_k = (2k+1)\frac{\pi}{2}i \cdot 2$$

$$z_k = (2k+1)\frac{\pi}{2} \cdot 1$$

-۹ مقدار اصلی عدد $(1-i)^{2i}$ کدام است؟

$$e^{-\frac{\pi}{2}}(\cos(\ln 2) + i \sin(\ln 2)) \cdot 2$$

$$e^{\frac{\pi}{2}}(\cos(\ln 2) + i \sin(\ln 2)) \cdot 1$$

$$e^{\frac{\pi^2}{2}}(\cos(\ln \sqrt{2}) + i \sin(\ln \sqrt{2})) \cdot 4$$

$$e^{-\frac{\pi^2}{2}}(\cos(\ln \sqrt{2}) + i \sin(\ln \sqrt{2})) \cdot 3$$

سوی سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵



پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

عنوان درس: ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی

رشه تحصیلی / کد درس: ۱۱۱۱۴۱۱-۱۱۱۱۰۹۵

۴. صفر

$$1 + \frac{i}{3}$$

۱-۴

۱. i

حاصل انتگرال $\int_c \bar{z} dz$ روی مسیر $c: z(t) = t + it^2, 0 \leq t \leq 1$ کدام است؟

۴. صفر

۲πi . ۳

$$\frac{2\pi i}{7}$$

۱. $\frac{\pi i}{3}$ حاصل انتگرال $\int_c \frac{z^4+1}{z^5-2} dz$ که در جهت مثبت مثلثاتی طی می شود کدام است؟با توجه به بسط سری لوران تابع $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2}$ حول $z = 0$ ، این نقطه چه نوع نقطه تکینی برای این تابع است؟

۴. قطب ساده

۳. قطب مرتبه دوم

۲. تکین برداشتی

۱. تکین اساسی

$$\frac{5\pi i}{8}$$

$$-\frac{3\pi i}{4}$$

$$-\frac{5\pi i}{8}$$

$$\frac{3\pi i}{4}$$

حاصل انتگرال $\int_{|z|=1} \frac{3z^4 + z^3 - 1}{(2z+1)^4} dz$ که مسیری که در جهت مثبت طی می شود کدام است؟

۴. ۲π

۳. π

$$\frac{\pi}{2}$$

۱. $\frac{\pi}{4}$ سری فوریه $f(x) = \begin{cases} 1-x & -\pi < x < 0 \\ x^2 + 1 & 0 < x < \pi \end{cases}$ با $x = 0$ در $f(x+2\pi) = f(x)$ به چه عددی همگرایست؟

۴. ۲

۳. ۱

۲. ۰

۱. ۰

در سری فوریه سینوسی تابع $f(x) = 2\sin x - 3\sin 3x, 0 < x < \pi$ سومین ضریب (b_3) کدام است؟

۴. -3

$$-\frac{1}{\pi}$$

۲. ۰

۱. $\frac{2}{\pi}$

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵



پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

عنوان درس: ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی

رشه تحصیلی / گذ درس: ۱۱۱۱۴۱۱ - ۱۱۱۱۰۹۵

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < a \\ 0 & x > a \end{cases} \quad \text{کدام است؟}$$

-۱۷

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin 2\alpha a}{\alpha} \quad .^4 \quad \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1 - \cos \alpha a}{\alpha} \quad .^3 \quad \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\cos \alpha a}{\alpha} \quad .^2 \quad \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \alpha a}{\alpha} \quad .^1$$

-۱۸ جواب عمومی معادله جزئی $u_{xy} = 1$ کدام است؟

$$u = xy + f(xy) + g(x^2 y) \quad .^2 \quad u = x^2 y + f\left(\frac{x}{y}\right) + g(x^2 + y^2) \quad .^1$$

$$u = 1 + f(xy) + g(xy^2) \quad .^4 \quad u = xy + f(x) + g(y) \quad .^3$$

-۱۹ جواب عمومی معادله دیفرانسیل جزئی $u_{xx} + u_{xy} + 15u_{yy} = 0$ کدام است؟

$$u = F(y - x) + G(y + x) \quad .^2 \quad u = F(y - 2x) + G(y + 4x) \quad .^1$$

$$u = F(y + x) + G(y + 4x) \quad .^4 \quad u = F(y - 3x) + G(y - 5x) \quad .^3$$

-۲۰ معادله موج یک بعدی $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ چه نوع معادله ای است؟

۱. سه‌می گون ۲. هذلولی گون ۳. بیضی گون ۴. هیپکدام

سوالات تشریحی

-۱ نشان دهید تابع $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 + e^{-y} \cos x$ همساز است. سپس مزدوج همساز و تابع تحلیلی که توسط آنها ساخته می‌شود را به دست آورید.

-۲ ثابت کنید $\mathcal{W} = \frac{1}{z}$ هر دایره یا خط راست را به روی یک خط راست یا دایره می‌نگارد.

-۳ با استفاده از قضیه مانده‌ها حاصل انتگرال زیر را محاسبه کنید.

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{5 - 4\cos \theta}$$

-۴ انتگرال فوريه تابع $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ را محاسبه کنید و به کمک آن حاصل انتگرال

$$\int_0^\infty \frac{\cos kx + x \sin kx}{x^2 + 1} dx$$

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵



پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

عنوان درس: ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی

رشته تحصیلی / کد درس: ۱۱۱۱۴۱۱ - ۱۱۱۱۰۹۵

۱۴۰ نمره

۵- معادله لاپلاس با شرایط مرزی زیر را به روش جداسازی متغیرها حل کنید.

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1 \\ u(0, y) = u(1, y) = u(x, 0) = 0 & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 \\ u(x, 1) = k & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$