

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

www.unipnuna.com

عنوان درس: مبانی منطق و نظریه مجموعه ها، منطق، منطق ریاضی
رشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی) ۱۱۱۱۰۵۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۰ - ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۳۸۳ - علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۳ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱- اگر دو مجموعه مجزای A و B به ترتیب دارای کاردینالهائی λ و κ باشند آنگاه $card(A \cup B)$ عبارت است از

۱. λ ۲. κ ۳. $\lambda + \kappa$ ۴. $\lambda \kappa$

۲- تعداد نمادهای رابط جمله ای چند تا است؟

۱. ۲ ۲. ۳ ۳. ۴ ۴. ۵

۳- کدامیک از عبارتهای زیر یک ف. د. س. است؟

۱. $A_1 \rightarrow \wedge A_2$ ۲. $(A_1 \rightarrow A_2)$ ۳. $A_1 \rightarrow A_2$ ۴. $(A_1 \rightarrow A_2)$

۴- طول ف. د. س. $(A_1 \rightarrow (A_2 \wedge A_3))$ کدامست؟

۱. ۲ ۲. ۴ ۳. ۶ ۴. ۹

۵- اگر تعداد موضعهایی که رابطهای دوتایی \wedge ، \vee ، \rightarrow و \leftrightarrow در ف. د. س. α ظاهر می شوند برابر ۷ باشد در این صورت تعداد موضعهایی که نمادهای جمله ای در آن ظاهر می شوند برابر است با:

۱. ۶ ۲. ۷ ۳. ۸ ۴. ۹

۶- فرض کنید U مجموعه اعداد حقیقی و $B = \{0\}$ و عمل S به صورت $S(x) = x+1$ باشد. در این صورت C عبارت است از:

۱. N ۲. $N \cup \{0\}$ ۳. Z ۴. R

۷- فرض کنید C از مجموعه $B = \{a, b\}$ با عمل دوتایی f و عمل یک تایی g پدید آمده باشد. در این صورت C_2 چند عضو دارد؟

۱. ۲ ۲. ۴ ۳. ۶ ۴. ۸

۸- ارزش ف. د. س. $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$ همواره برابر است با:

۱. ارزش P ۲. ارزش Q ۳. F ۴. T

۹- طبق قضیه یگانه خوانی، پنج عمل فرمول ساز وقتی به مجموعه ف. د. س. ها محدود می شوند آنگاه

۱. یک به یک هستند. ۲. پوشا هستند.
۳. دو سویی هستند. ۴. دارای برد یکسان هستند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

www.pnuna.com

عنوان درس: مبانی منطق و نظریه مجموعه ها، منطق، منطق ریاضی
رشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی) ۱۱۱۱۰۵۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۰ - ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۳۸۳ - علوم کامپیوتر،
علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۳
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱۰- ف. د. س. $A \wedge B \rightarrow \neg C \vee D$ معادل است با:

۱. $((A \wedge B) \rightarrow (\neg(C \vee D)))$.۱
۲. $((A \wedge B) \rightarrow ((\neg C) \vee D))$.۲

۳. $(A \wedge (B \rightarrow (\neg C))) \vee D$.۳
۴. $((A \wedge B) \rightarrow (\neg C)) \vee D$.۴

۱۱- کدامیک از مجموعه های زیر تمام نیست؟

۱. $\{\neg, \wedge\}$.۱
۲. $\{\downarrow\}$.۲
۳. $\{\wedge, \leftrightarrow\}$.۳
۴. $\{\neg, \rightarrow\}$.۴

۱۲- تاخیر ف. د. س. $((A \vee (\neg B)) \rightarrow (B \wedge C))$ کدام است؟

۱. ۱ .۱
۲. ۲ .۲
۳. ۳ .۳
۴. ۴ .۴

۱۳- کدامیک از عبارتهای زیر معادل جمله $\langle\langle$ هر عدد طبیعی غیر صفر تالی یک عدد است $\rangle\rangle$ می باشد؟

۱. $\forall v_1 (v_1 \approx 0 \rightarrow \exists v_2 v_1 \approx S v_2)$.۱

۲. $\forall v_1 (v_1 \neq 0 \rightarrow \exists v_2 v_2 \approx S v_1)$.۲

۳. $\forall v_1 ((\neg \approx v_1 0) \rightarrow (\neg \forall v_2 (\neg \approx v_1 S v_2)))$.۳

۴. $\forall v_1 ((\approx v_1 0) \rightarrow (\neg \forall v_1 (\approx v_1 S v_2)))$.۴

۱۴- کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟

۱. $\exists x \forall y Pxy \models \forall y \exists x Pxy$.۱
۲. $\forall y \exists x Pxy \models \exists x \forall y Pxy$.۲

۳. $Qv_1 \models \forall v_1 Qv_1$.۳
۴. $\forall v_1 Qv_1 \models Qv_2$.۴

۱۵- اگر f یک نماد تابعی n موضعی باشد آنگاه

۱. $K(f) = 1 - n$.۱
۲. $K(f) = -n$.۲
۳. $K(f) = 1$.۳
۴. $K(f) = 0$.۴

۱۶- اگر α' یک قطعه آغازی سره از ف. د. س. α باشد آنگاه

۱. $K(\alpha') = 1$.۱
۲. $K(\alpha') = 0$.۲
۳. $K(\alpha') = -1$.۳
۴. $K(\alpha') < 1$.۴

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

www.unipnuna.com

عنوان درس: مبانی منطق و نظریه مجموعه ها، منطق، منطق ریاضی
رشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی) ۱۱۱۱۰۵۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۰ - ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۳۸۳ - علوم کامپیوتر،
علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۳ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱۷- کدام یک از گزینه های زیر جزء اصول منطقی نمی باشد؟

۱. توتولوژیها

۲. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta)$

۳. $\alpha \rightarrow \forall x\alpha$ که در آن x در α آزاد نیست.

۴. $\alpha_t^x \rightarrow \forall x\alpha$ که t می تواند جایگزین x در α باشد.

۱۸- اگر $\Gamma \mid -\phi$ و x در هیچ فرمولی در Γ آزاد نباشد، آنگاه

۴. $\Gamma \mid -\exists x\phi$

۲. $\Gamma \mid -\forall x\phi$

۲. $\Gamma \mid -\forall x(\neg\phi)$

۱. $\Gamma \mid -\forall x\phi$

۱۹- در استدلال $\Gamma; \phi \mid -\psi \Rightarrow \Gamma \mid -(\phi \rightarrow \psi)$ از کدام قاعده زیر استفاده شده است؟

۴. قضیه تعمیم

۳. قاعده عکس نقیض

۲. قضیه استنتاج

۱. قاعده T

۲۰- قضیه تمامیت گودل معادل کدام گزینه زیر است؟

۲. اگر Γ ارضا شدنی باشد آنگاه Γ سازگار است.

۱. اگر Γ سازگار باشد آنگاه $\phi \mid = \Gamma$

۴. اگر $\Gamma \mid = \phi$ آنگاه $\Gamma \mid -\neg\phi$

۳. اگر $\Gamma \mid = \phi$ آنگاه $\Gamma \mid -\phi$

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

۱- فرض کنید U مجموعه عبارتها و $B \subseteq U$ یک مجموعه آغازین باشد. در صورتیکه C^* اشتراک همه زیر

مجموعه های استقرایی U و C^* شامل همه چیزهایی باشد که بتوانند از B با عمل دوتایی f و عمل یک

تایی g به دفعاتی متناهی بدست آید، در این صورت نشان دهید: $C^* = C_*$

۱.۴۰ نمره

۲- نشان دهید که اگر $\sum \mid = \tau$ ، آنگاه یک زیر مجموعه متناهی از \sum مانند \sum_0 وجود دارد به طوریکه

$\sum_0 \mid = \tau$

۱.۴۰ نمره

۳- متغیر آزاد را بصورت بازگشتی تعریف کنید و یک مثال برای آن بیاورید.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

PNUNA.COM

عنوان درس: مبانی منطق و نظریه مجموعه ها، منطق، منطق ریاضی

رشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی) (۱۱۱۱۰۵۷) - علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۳۳۰) - ریاضیات و کاربردها (۱۱۱۱۳۸۳) - علوم کامپیوتر،

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

علوم کامپیوتر (چندبخشی) (۱۱۱۵۱۷۳)

نمره ۱.۴۰

۴- فرض کنید S_1 و S_2 توابعی از V در \mathcal{A} باشند که به ازای همه متغیرهایی (در صورت وجود) که در F د.

س Φ آزادند، هم مقدار باشند. نشان دهید که

$$|\models_{\mathcal{A}} \Phi[S_2] \Leftrightarrow |\models_{\mathcal{A}} \Phi[S_1]$$

نمره ۱.۴۰

۵- نشان دهید برای هر ترم t ، $K(t) = 1$.