

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کام

روشهای تحقیقی / گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۱۵۰۰۶ - راهنمای

عمومی، روانشناسی تربیتی ۱۲۱۷۱۸۲ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳

۱- اندازه ای که در آن مؤلفه خطاب بزرگ باشد، آن خیلی پایین خواهد بود.

- ۴. پایابی
- ۳. روایی سازه
- ۲. روایی همزمان
- ۱. روایی صوری

۲- کدام یک از نام‌های انتخاب شده زیر را SPSS به عنوان نام یک متغیر می‌پذیرد؟

- ۴. Tehe?Mash
- ۳. Tehemah
- ۲. Teh Mash
- ۱. Teh

۳- کدام یک از دکمه‌های زیر همه دستورهای قبلی را در کادر گفتگوی SPSS حذف می‌کند؟

- ۴. Help
- ۳. Cancel
- ۲. Reset
- ۱. OK

۴- در SPSS دکمه Variable View به چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- ۱. برای نام گذاری و ویرایش نام، نوع، برچسب و قید و شرط‌های متغیرها
- ۲. برای وارد کردن داده‌ها و تغییر و اصلاح داده‌های خام
- ۳. برای بررسی بروندادهای SPSS
- ۴. برای ویرایش نمودارها و جدول‌ها

۵- کدام یک از گزینه‌های زیر این امکان را فراهم می‌سازند تا یک ستون از مجموعه داده‌ها به صورت صعودی یا نزولی مرتب شوند؟

- ۴. Weight cases
- ۳. Sort cases
- ۲. Select cases
- ۱. Split file

۶- برای تقسیم کردن یک فایل در SPSS کدام گزینه را در منوی Data انتخاب می‌کنید؟

- ۴. Split file
- ۳. Select Cases
- ۲. Merge files
- ۱. Sort Cases

۷- کدام یک از آزمون‌های آماری زیر توزیع بهنجاری یا نرمال داده‌ها را آزمون می‌کند؟

- ۲. کوکران
- ۴. کروسکال والیس
- ۳. تای کندال

۸- وقتی که تعداد زیادی داده‌های پرت در مجموعه داده‌ها وجود داشته باشد، پژوهشگر باید:

- ۱. از آزمون‌های پارامتریک استفاده کند.
- ۲. از آزمون‌های غیرپارامتریک استفاده کند.
- ۳. به دقت بررسی کند که چرا داده‌های پرت وجود دارند و در مورد حذف یا اصلاح آنها تصمیم گیری کند.
- ۴. این مطالعه را کنار بگذارد چون داده‌های پرت همیشه طرح را ضعیف نشان می‌دهند.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰



زمان آزمون (دقیقه): تست: ۶۰ تشتی: ۰

**عنوان درس:** فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر در روانشناسی، روش تحقیقی / گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۱۵۰۰۶ -، راهنمایی عمومی، روانشناسی تربیتی ۱۲۱۷۱۸۲ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳

۹- کدام یک از نمودارهای زیر برای نمایش توزیع یک متغیر پیوسته مناسب است؟

- |            |        |            |
|------------|--------|------------|
| ۱. ستونی   | ۲. خطی | ۳. میله ای |
| ۴. جعبه ای |        |            |

۱۰- با کدام یک از نمودارهای زیر می توان داده های پرت را شناسایی کرد؟

- |            |        |            |
|------------|--------|------------|
| ۱. ستونی   | ۲. خطی | ۳. میله ای |
| ۴. جعبه ای |        |            |

۱۱- گزینه Compute در منوی Transform برای اجرای کدام یک از فرمان های زیر مناسب است؟

- |                       |                 |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| ۱. مرتب کردن داده ها  | ۲. انتخاب موارد | ۳. محاسبه نمره کلی مقیاس ها |
| ۴. تقسیم فایل داده ها |                 |                             |

۱۲- دامنه بهینه برای همبستگی بین سؤالی به عنوان شاخص پایایی مقیاس چقدر است؟

- |                        |                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| ۱. ۱-تا+۱              | ۲. دو دهم (۰/۲) تا چهار دهم (۰/۴) | ۳. هفت دهم (۰/۷) تا یک |
| ۴. هشت دهم (۰/۸) تا یک |                                   |                        |

۱۳- برای بررسی رابطه بین دو متغیر پیوسته از کدام آزمون زیر استفاده می شود؟

- |                   |              |                            |
|-------------------|--------------|----------------------------|
| ۱. همبستگی پیرسون | ۲. مجذور کای | ۳. همبستگی رتبه ای اسپیرمن |
| ۴. همبستگی        |              |                            |

۱۴- برای بررسی این سوال که آیا تفاوتی بین نمره های خوش بینی افراد سه گروه سنی زیر ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۹ سال و بالاتر وجود دارد، کدام یک از آزمون های زیر مناسب است؟

- |                                       |                                    |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| ۱. U مان-ویتنی                        | ۲. تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی | ۳. t مستقل |
| ۴. تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر |                                    |            |

۱۵- با استفاده از کدام همبستگی می توان رابطه بین دو متغیر را بعد از کنترل اثر یک متغیر دیگر بررسی کنیم؟

- |           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| ۱. پیرسون | ۲. اسپیرمن | ۳. چندگانه |
| ۴. تفکیکی |            |            |

۱۶- در کدام یک از شرایط زیر می توان از همبستگی اسپیرمن برای تحلیل داده ها استفاده کرد؟

۱. حداقل یکی از متغیرها باید طبقه ای باشد.
۲. همه متغیرها باید توزیع نرمال یا بهنجار داشته باشند.
۳. داده ها باید حداقل در سطح مقیاس ترتیبی یا رتبه ای باشند.
۴. مقدار P برای آزمون لون باید بزرگتر از ۰/۰۵ باشد.

س.م. س.م. ۱۰.۱۱.۱۲

زمان آزمون (دقیقه): تست: ۶۰ تشنج:



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر در روانشناسی عمومی ۱۱۱۵۰۰۶ -، راهنمایی عمومی، روانشناسی تربیتی ۱۲۱۷۱۸۲ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳

۱۷- دامنه ضریب همبستگی چقدر می باشد؟

- |                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| ۱. از صفر تا +۱        | ۲. از -۱ تا +۱ | ۳. از صفر تا -۱ |
| ۴. محدودیتی وجود ندارد |                |                 |

۱۸- در آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر مقدار ۱ برابر هشت صد و نود و پنج هزارم (۸۹۵/۰) به دست آمده است. واریانس مشترک یا ضریب تعیین بین دو متغیر چقدر خواهد بود؟

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| ۱. ۵۹/۸ | ۲. ۸۰/۱ | ۳. ۸۹/۵ | ۴. ۹۵/۸ |
|---------|---------|---------|---------|

۱۹- با استفاده از ملاک کوهن، در تعیین شدت همبستگی کدام یک از ضرایب زیر اندازه اثر متوسط می باشد؟

- |                 |                          |                           |                        |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| ۱. یک صدم (۱/۰) | ۲. بیست و پنج صدم (۲۵/۰) | ۳. پنجاه و پنج صدم (۵۵/۰) | ۴. سی و پنج صدم (۳۵/۰) |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|

۲۰- تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی (ANOVA) جزء کدام یک از روش های زیر محسوب می شود؟

- |            |            |              |                  |
|------------|------------|--------------|------------------|
| ۱. طبقه ای | ۲. همبستگی | ۳. پارامتریک | ۴. غیر پارامتریک |
|------------|------------|--------------|------------------|

۲۱- هنگامی که پژوهشگر فرض صفر را با وجود اینکه درست است رد کند مرتکب کدام نوع خطای شود؟

- |               |               |                   |                     |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| ۱. خطای نوع ۱ | ۲. خطای نوع ۲ | ۳. خطای استاندارد | ۴. خطای اندازه گیری |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------|

۲۲- کدام یک از گزینه های زیر از مفروضه های آزمون نمونه های مستقل محسوب نمی شود؟

- |  |                        |                              |
|--|------------------------|------------------------------|
| ۱. متغیر مستقل پیوسته                          | ۲. متغیر وابسته پیوسته | ۳. همگنی واریانس بین گروه ها |
|  |                        |                              |
| ۴. بهنگاری توزیع متغیرهای وابسته در هر دو گروه |                        |                              |

۲۳- آزمون لون چه چیزی را نشان می دهد؟

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ۱. همگنی واریانس های بین دو گروه              | ۲. تفاوت بین میانگین های یک گروه و جامعه | ۳. تفاوت در نمرات متغیر وابسته بین دو گروه مجزا از هم |
|   |  |   |
| ۴. تفاوت در میانگین نمرات در شرایط درون گروهی |  |   |

۲۴- گزینه Paired samples T Test در منوی فهرست کرکره ای Analyse Compare Means از منوی Paired samples T Test در کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

- |                                       |   |                                  |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| ۱. مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل | ۲. مقایسه میانگین نمرات دو گروه همتاشده | ۳. مقایسه میانگین نمرات چند گروه |
|                                       |   |                                  |
| ۴. رابطه بین چند متغیر                |   |                                  |

- ۲۵- کدام یک از آزمونهای زیر معادل غیرپارامتری آزمون  $\tau$  وابسته است؟

۱. آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

۲. آزمون کروسکال والیس

۳. آزمون U مان- ویتنی

- ۲۶- چه زمانی لازم است پژوهشگر از آزمون های تعقیبی یا پس از تجربه استفاده کند؟

۱. هنگامی که بیش از دو گروه وجود داشته باشد و F کلی معنی دار باشد.

۲. وقتی که تنها دو گروه وجود داشته باشد.

۳. همیشه می تواند از آزمون های تعقیبی استفاده کند.

۴. هنگامی که نتایج معنی دار نباشد.

- ۲۷- کدام یک از آماره های زیر در موقع تخطی از مفروضه های همگنی واریانس ها در تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی ترجیح داده می شوند؟

Scheffe-Tukey . ۲

LSD-Duncan . ۱

Brown Forsythe-Welch . ۴

Bonferroni . ۳

- ۲۸- برای اجرای آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر کدام گزینه را در منوی models انتخاب می کنیم؟

Multivariate . ۲

univariate . ۱

Variance components . ۴

Repeated Measures . ۳

- ۲۹- آزمون U مان- ویتنی یک آزمون ..... معادل آزمون  $\tau$  ..... می باشد؟

۱. غیر پارامتری- مستقل

۲. غیر پارامتری- وابسته

۳. پارامتری- مستقل

۴. پارامتری- وابسته

- ۳۰- روش اندازه گیری زمانی روایت که:

۱. اندازه هایی ایجاد کند که ثابت و یکسان باشند.

۲. اندازه هایی ایجاد کند که واضح، بدیهی و آشکار باشند.

۳. اندازه هایی ایجاد کند که منطقی هستند.

۴. اندازه هایی ایجاد کند که شما آنها را می خواهید، بسنجد.