

سوی سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / گد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ -

۱- حالت خفیف تر اختلال دو قطبی چه نام دارد؟

۱. ادواری خوبی ۲. افسردگی فصلی ۳. افسردگی خوبی ۴. هیچکدام

۲- افسردگی درون زاد را می گویند.

۱. افسردگی مضاعف ۲. افسردگی بدون مالیخولیا ۳. افسردگی همراه با مالیخولیا ۴. افسردگی اساسی

۳- سطوح پایین کدام انتقال دهنده موجب افسردگی می شود؟

۱. دوپامین ۲. استیل کولین ۳. سروتونین ۴. نور اپی نفرین

۴- از نظر لوینسون تبیین نظریه های رفتاری در مورد علت افسردگی چیست؟

۱. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت ۲. وابستگی به دیگران ۳. تثبیت در غم و اندوه ۴. عزت نفس پایین

۵- کدام گزینه مربوط به مثلث شناختی نیست؟

۱. باورهای مربوط به آینده ۲. باورهای مربوط به رخدادها یا افراد ۳. باورهای مربوط به خود

۶- نتیجه گیری های منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد بر حسب یک مورد جزء کدام پنج خطای منطقی فرد افسرده است؟

۱. انتزاع گزینشی ۲. تعییم مفرط ۳. استنباط دلخواه ۴. شخصی سازی

۷- کدام یک از داروها عمر انتقال دهنده های عصبی را در افسردگی افزایش می دهد؟

۱. TCA . ۲. SSRI . ۳. Orap . ۴. MAOI

۸- میزان سروتونین پایین همراه با نور اپی نفرین بالا منجر به بروز کدام اختلال می گردد؟

۱. مانیا ۲. افسردگی ۳. اسکیزوفرنی ۴. سایکوز

۹- شدیدترین اختلال روانی کدام است؟

۱. افسردگی ۲. اسکیزوفرنی ۳. دوقطبی ۴. مانیا

۱۰- هبفرنیا کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. کاتاتونیک ۲. باقی مانده ۳. آشفته ۴. پارانویید

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱۱- اسکیزوفرنی مزمن چه نشانه هایی دارد؟

- ۱. شروع ناگهانی
- ۲. احتمال بهبودی زیاد
- ۳. پیش آگهی خوب
- ۴. پیش آگهی بد

۱۲- مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی چیست؟

- ۱. آشفتگی در فرایندهای تفکر
- ۲. مکالمات فاقد هماهنگی
- ۳. هذیان بزرگ منشی
- ۴. هذیان کنترل

۱۳- مصرف کدام ماده مخدر منجر به بروز بعدی اسکیزوفرنی می شود؟

- ۱. تریاک
- ۲. کوکائین
- ۳. شیشه
- ۴. هروئین

۱۴- کدام مطالعه تصویر برداری نخستین و قانع کننده تربیت داده ها را از این که اسکیزوفرنی یک بیماری مغزی واقعی است به دست داده است؟

- ۱. CT
- ۲. rCBF
- ۳. SPET
- ۴. FMRI

۱۵- ضایعات در کدام قسمت مغز باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهם شناوبی شدید می شود؟

- ۱. لوب پیش پیشانی
- ۲. لوب گیجگاهی
- ۳. لوب تمپورال
- ۴. لوب پس سری

۱۶- حجم کوچکتر گیروس استریت در اسکیزوفرنها با کدام یک از ناسازگاری های زیر ارتباط دارد؟

- ۱. رفتاری
- ۲. اجتماعی
- ۳. تحصیلی
- ۴. جنسی

۱۷- مصرف کدام ماده مخدر باعث بالا رفتن دوبامین می شود؟

- ۱. شیشه
- ۲. کراک
- ۳. تریاک
- ۴. حشیش

۱۸- کدام یک از داروهای زیر فقط بر روی نشانه های مثبت اسکیزوفرنی اثر می گذارد؟

- ۱. کلوزاپین- هالوپریدول
- ۲. کلرپرومازین- هالوپریدول
- ۳. دیازپام- کلر پرومازین
- ۴. کلوزاپین- کلر پرومازین

۱۹- روابط شخصی بی ثبات و شدید ویژگی کدام اختلال شخصیت می باشد؟

- ۱. وسواسی- جبری
- ۲. خودشیفتہ
- ۳. مرزی
- ۴. پارانوئید

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ -

۲۰- عمل در جهت عکس محتوای طرحواره جزء کدام یک از سه فرایند طرحواره است؟

۱. جبران طرحواره ۲. حفظ طرحواره ۳. اجتناب از طرحواره ۴. هیچکدام

۲۱- کدام اختلال شخصیت با بالا رفتن سن و از دست دادن مقام دچار افسردگی می شود؟

۱. نمایشی ۲. خودشیفت ۳. مرزی ۴. ضد اجتماعی

۲۲- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی و کاهش حجم ماده کدام قسمت مغز در ایجاد شخصیت ضد اجتماعی نقش دارد؟

۱. دوپامین - پیش پیشانی ۲. سروتونین - پس سری ۳. دوپامین - پس سری ۴. سروتونین - پیش پیشانی

۲۳- شروع نوع بدخیم بیماری MS معمولا در چه سنینی رخ می دهد؟

۱. قبل از ۱۵ سالگی ۲. بعد از ۴۰ سالگی ۳. ۳۵ سالگی ۴. بعد از ۲۰ سالگی

۲۴- رایج ترین نشانه های صدمات بسته چیست؟

۱. آسیب های حافظه ای ۲. آسیب های شناختی ۳. نقص های شناختی و عصب - رفتاری ۴. آسیب به مهارت های زبانی

۲۵- ویژگی زیر مربوط به کدام اختلال می باشد؟ (دوری گزین و علاقه مند شدید به ایجاد رابطه با دیگران)

۱. اسکیزوئید ۲. اسکیزوتاپیال ۳. اجتنابی ۴. پارانوئید

۲۶- شایع ترین اختلال شخصیت کدام است؟

۱. مرزی ۲. هیستریک ۳. واپسته ۴. اجتنابی

۲۷- فوری ترین پیامد بی اشتها یی روانی چیست؟

۱. قطع دوره های ماهیانه ۲. لاغری شدید ۳. ضعف جسمانی ۴. بدشکلی بدن

۲۸- ۸۰ الی ۹۰ درصد افراد مبتلا به پراشتها یی روانی بعد از خوردن غذا جهت کنترل وزنشان چه کاری را انجام می دهند؟

۱. استفاده از ملین ها ۲. استفراغ عمده ۳. ورزشهای شدید ۴. همه موارد

۲۹- تنقیه کردن و روزه داری به ترتیب جزء کدام یک از انواع پراشتها یی هستند؟

۱. غیر تخلیه ای - تخلیه ای ۲. تخلیه ای - تخلیه ای ۳. غیر تخلیه ای - غیر تخلیه ای ۴. تخلیه ای - غیر تخلیه ای

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

- ۳۰- مهمترین پیام رفتارهای جبرانی پراستهایی روانی چیست؟

۲. مشکلات گوارشی

۱. عدم تعادل الکتروولیت

۴. آسیب به پشت دندانها

۳. آسیب شکمی

- ۳۱- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی منجر به جستجوی کربوهیدراتها و دوره های پرخوری می شود؟

۴. سروتونین

۳. استیل کولین

۲. نور اپی نفرین

۱. دوپامین

- ۳۲- از نظر فروید تثبیت در کدام مرحله رشد موجب بی اشتهایی روانی می شود؟

۴. مقعدی

۳. دهانی

۲. تناسلی

۱. جنسی

- ۳۳- کودکانی که دچار شب ادراری و یا راه رفتن در خواب هستند معمولاً در کدام مرحله از خواب می باشند؟

۴. اول و دوم

۳. سوم و چهارم

۲. اول و چهارم

۱. سوم و دوم

- ۳۴- کدام اختلال خواب موجب مشکل در کارکردهای اجتماعی، شغلی فرد می شود؟

۲. پرخوابی اولیه

۱. حمله خواب

۴. اختلال خواب دوره شبانه روزی

۳. بی خوابی اولیه

- ۳۵- مهمترین درمان نارکولپسی چیست؟

۴. دارو درمانی

۳. تمرکز

۲. آرمیدگی

۱. شوک درمانی

- ۳۶- کدام دارو برای درمان کابوس در خواب تجویز می شود؟

۴. بنزو دیازپین

۳. زالپلون

۲. زولپیدم

۱. سه حلقه ای

- ۳۷- نمایش آلت به فرد غریبه ای که انتظار این کار را از او ندارد جزء کدام نوع پارافیلی ها است؟

۴. تماساگری جنسی

۳. نمایشگری جنسی

۲. سادیسم جنسی

۱. یادگارخواهی جنسی

- ۳۸- مهمترین دارو برای درمان اختلال نعوظی چیست؟

۴. ویاگرا

۳. زالپلون

۲. دیازپام

۱. فیناستراید

- ۳۹- بیزاری درمانی در مبدل پوشی معمولاً چگونه انجام می شود؟

۴. همه موارد

۳. گفتار درمانی

۲. دارو درمانی

۱. شوک درمانی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ -

- هویت جنسی زنانه در مردان طبق تبیین رویداد تحلیلی ناشی از چیست؟

۱. وابستگی به مادر
۲. بیزاری از پدر
۳. اضطراب جدایی مفرط اولیه
۴. افسردگی