

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- بر طبق نتایج پژوهش های برونیش و ویچن ۱۹۹۴ چند درصد افرادی که هیچ اختلال روانی نداشتند تفکراتی در مورد خودکشی نشان دادند؟

۰.۱ ۲ درصد ۰.۲ ۸ درصد ۰.۳ ۶۵ درصد ۰.۴ ۶۹ درصد

۲- کدام دانشمند، احساس گناه، نشانه های هذیانی افسرده وار و ناآرامی درونی و بی قراری را از جمله ویژگی های روانشناختی افرادی می داند که تلاش هایی برای خودکشی دارند؟

۰.۱ ابرامسون ۰.۲ بک ۰.۳ دورکیم ۰.۴ ولفر سدورف

۳- در اواسط دهه ۱۹۸۰ کدام اختلال بوسیله روزنتال و همکارانش مطرح گردید؟

۰.۱ اختلال دو قطبی ۰.۲ اختلال عاطفی فصلی
۰.۳ اختلال افسردگی اساسی ۰.۴ اختلال ادواری خوبی

۴- سطح پایین ملاتونین باعث ایجاد کدام حالت در فرد می شود؟

۰.۱ خلق پایین ۰.۲ هیپومانیا ۰.۳ خلق بالا و سرخوشی ۰.۴ غمگینی مفرط

۵- کدام دسته از اختلالات تاریخچه پژوهشی کوتاهی را به خود اختصاص داده است؟

۰.۱ عاطفی فصلی ۰.۲ افسرده خوبی ۰.۳ دو قطبی نوع I ۰.۴ مانیک دپرسیو

۶- فرد مبتلا به کدام اختلال ممکن است بوسیله اعمال دیگران ناکامی را تجربه کند؟

۰.۱ مانیک ۰.۲ افسردگی اساسی ۰.۳ اسکیزوفرنی ۰.۴ افسردگی فصلی

۷- کدامیک از اختلالات زیر اختلال مزمنی است که حداقل ۲ سال ادامه دارد و فرد مبتلا، هیپومانیا را به صورت دوره ای تجربه می کند؟

۰.۱ دو قطبی ۰.۲ عاطفی فصلی ۰.۳ ادواری خوبی ۰.۴ افسردگی

۸- لیتیوم برای درمان کدام اختلال موثر می باشد؟

۰.۱ استرس ۰.۲ اضطراب ۰.۳ افسردگی ۰.۴ دو قطبی

۹- کدام نوع اسکیزوفرنی هم اکنون در کشورهای صنعتی به ندرت دیده می شود؟

۰.۱ آشفته ۰.۲ پارانوئید ۰.۳ باقی مانده ۰.۴ کاتاتونیک

۱۰- فقر گفتار، بی حالتی عاطفی، فقدان لذت، انزوا از ویژگی کدام دسته از اسکیزوفرنی می باشد؟

۰.۱ پارانوئید ۰.۲ آشفته ۰.۳ مثبت ۰.۴ منفی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- بر اساس مطالعات لیدل و همکاران کاهش RCBF در کرتکس پره فرونتال میانی و چپ منجر به چه عاملی می شود؟

۱. فقر روانی-حرکتی
۲. افزایش مسائل مربوط به حرکت
۳. کاهش سازمان نیافتگی
۴. افزایش هیجانات

۱۲- بر چه اساسی می توان ناهماهنگی دو قلوبهای یک تخمکی را درابتلا به اسکیزوفرنی تمیز داد؟

۱. بررسی بطن ها و کاهش حجم کرتکس تمپورال
۲. بررسی لوب پاریتال تحتانی چپ
۳. کاهش فعالیت آلفا در نیمکره چپ
۴. افزایش حجم کرتکس تمپورال

۱۳- بر طبق پژوهش بارچ و همکاران (۲۰۰۲) کدام ناحیه در بیماران اسکیزوفرنی در دو حافظه کاری و بلند مدت کاهش فعالیت را نشان می دهد؟

۱. کرتکس سینگولار قدامی دو طرف
۲. لوب تمپورال میانی
۳. کرتکس پره فرونتال دورسولا ترال راست
۴. کرتکس پره فرونتال میانی و چپ

۱۴- ممانعت از جذب کدام دسته از داروها در مکان گیرنده پس سیناپسی از انتقال دوپامین جلوگیری می کند؟

۱. ترازادون
۲. فنوباربیتال
۳. سرتالین
۴. فنوتیازین

۱۵- بررسی های پس از مرگ بیماران اسکیزوفرنیک کاهش در تراکم نورون های کدام قسمت را نشان می دهند؟

۱. هیپوکامپ
۲. تالاموس
۳. پیشانی
۴. هیپوتالاموس

۱۶- چه کسی معتقد بود که هذیان ها، اعمال گفتاری خالی هستند که به دنیا و خویشان معطوف نیستند و آنها نماد چیزی نیستند؟

۱. بنتال
۲. همزلی
۳. بریوس
۴. آدل دیاموند

۱۷- کدام دارو اثر مستقیمی بر روی توهمات و هذیان ها دارد؟

۱. کلوزاپین
۲. ترازادون
۳. فلووکسامین
۴. پروکستین

۱۸- بیوست، آشفتهگی های بینایی و کاهش یا افزایش وزن از عوارض کدام دارو محسوب می شود؟

۱. دسی پرامین
۲. پروزاک
۳. کلوزاپین
۴. کلرپرومازین

۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال محسوب می شود؟

۱. سوء ظن
۲. فاقد انعطاف پذیری
۳. حساسیت
۴. از نظر هیجانی سرد

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
 سری سوال: ۱ یک
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲
 رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۰- کدام گزینه جز ویژگی های شخصیتی اختلال اسکیزوئید محسوب می شود؟

۱. خسته کردن دیگران
 ۲. توانایی در ابراز مستقیم خشم
 ۳. ناپهنجاری در تفکر
 ۴. فقدان اعتماد به نفس

۲۱- شیوع کدام دسته از اختلالات شخصیتی، ۳ درصد جمعیت عمومی را شامل می شود؟

۱. دوری گزین
 ۲. مرزی
 ۳. خودشیفته
 ۴. اسکیزوتایپال

۲۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی، تحت تاثیر استرس، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکنند؟

۱. دوری گزین
 ۲. وابسته
 ۳. نمایشی
 ۴. پارانویید

۲۳- شیوع اختلال شخصیت نمایشی چند درصد می باشد؟

۱. ۳ تا ۴ درصد
 ۲. ۲ تا ۳ درصد
 ۳. ۱ درصد
 ۴. ۲/۵ درصد

۲۴- رفتارهایی نظیر بریدن بازوها، پاها و سوزاندن، در کدام دسته از اختلالات شخصیتی مشاهده می گردد؟

۱. ضد اجتماعی
 ۲. اختلال شخصیت مرزی
 ۳. اسکیزوئید
 ۴. وسواسی-جبری

۲۵- در کدام یک از اختلالات شخصیتی افراد در روابط بین فردی، به درجه بالایی از محبت نیاز دارند؟

۱. اسکیزوئید
 ۲. خود شیفته
 ۳. نمایشی
 ۴. اجتنابی

۲۶- کدامیک از مشکلات روانشناختی در بین مبتلایان به بی اشتهایی روانی شایع می باشد؟

۱. اضطراب
 ۲. افسردگی شدید
 ۳. خود شیفتگی
 ۴. استرس

۲۷- تحریک کدام ناحیه باعث کاهش احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوتالاموس
 ۲. تالاموس
 ۳. هیپوتالاموس شکمی
 ۴. هیپوتالاموس جانبی

۲۸- کدام مورد جز اهداف مداخلات درمانی شناختی محسوب می شود؟

۱. ایجاد جذابیت جسمانی
 ۲. کنترل فراخود
 ۳. ایجاد اتحاد درمانی
 ۴. رشد و پرورش خودمختاری

۲۹- در فاصله سنی ۲۵ تا ۴۴ سال مردها بطور متوسط چند کیلو گرم افزایش وزن دارند؟

۱. ۷
 ۲. ۵
 ۳. ۴
 ۴. ۲

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- در کدام مرحله خواب non-REM مغز یک نوع الگوی فعالیتی متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

- ۰۱ اول ۰۲ دوم ۰۳ سوم ۰۴ چهارم

۳۱- کدام مورد محرک اشتها و هوشیاری محسوب می شود؟

- ۰۱ سروتونین ۰۲ نوروترانسمیتر هیپوکرتین
۰۳ اپی نفرین ۰۴ دوپامین

۳۲- لیومان و همکاران ۱۹۹۱ شیوع اختلال نعوظی را برای سنین ۴۰ الی ۴۹ سالگی چند درصد برآورد کرده اند؟

- ۰۱ ۱۱ درصد ۰۲ ۷ درصد ۰۳ ۱۳ درصد ۰۴ ۱۸ درصد

۳۳- داروی ویباگرا در درمان کدام اختلال موثر واقع می شود؟

- ۰۱ انزال زودرس ۰۲ بیضاری جنسی
۰۳ میل جنسی کم کار ۰۴ نعوظ

۳۴- کدام گزینه جز عوارض جنبی داروی سیلدنافیل محسوب می شود؟

- ۰۱ کاهش ضربان قلب ۰۲ اختلال در دید رنگ
۰۳ برافروختگی چشم ها ۰۴ آشفته گی کلیوی

۳۵- کدام دانشمند به این نتیجه دست یافت که مردان مبدل پوش به احتمال بیشتری نسبت به مردان دیگر والدین خود را فاقد ویژگی های مربوط به نوع جنس ارزیابی می کردند؟

- ۰۱ بن کرافت ۰۲ مسترز ۰۳ نیوکامب ۰۴ جانسون

۳۶- در کدام نوع دمانس رفتارهای مشکل دار نظیر شگفتی واضح می باشند؟

- ۰۱ متوسط ۰۲ مبهم ۰۳ خفیف ۰۴ شدید

۳۷- ژن های موجود در کروموزوم های ۱۴، ۱۹، ۲۱ در ایجاد کدام بیماری دخالت دارند؟

- ۰۱ پارکینسون ۰۲ آلزایمر ۰۳ ام اس ۰۴ صرع

۳۸- عوامل خطر برای بروز زوال عقل در بیماران پارکینسونی شامل کدام مورد می شود؟

- ۰۱ جنسیت ۰۲ مدت زمان بیماری
۰۳ آستانه تحمل درد پایین ۰۴ ژنتیک

۳۹- بی خوابی از جمله مشکلات روانی مبتلایان به کدام نوع بیماری می باشد؟

- ۰۱ ام اس ۰۲ صرع ۰۳ پارکینسون ۰۴ آلزایمر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۴۰- کدام دارو جز داروهای ضد صرع محسوب می شود؟

۰۴ پروکستین

۰۳ کاربامازپین

۰۲ سرتالین

۰۱ ترازودن

WWW.PNUNA.COM