

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : قسمی : ۱۲۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : قسمی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : شیمی تجزیه ۱

و شته تحصیلی / گد درس : شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض، شیمی (شیمی تجزیه) ۱۱۱۴۰۱۸

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- حلایت رسوب PbI_2 در حضور $Pb(NO_3)_2$ ۰/۰۲۵ مولار چقدر می باشد؟ ($K_{sp} = 7.1 \times 10^{-9}$)

۱. $1.2 \times 10^{-3} M$ ۲. $2.7 \times 10^{-4} M$ ۳. $1.2 \times 10^{-6} M$ ۴. $2.7 \times 10^{-6} M$

- قدرت یونی محیط تابع کدامیک از موارد زیر است؟

۱. غلظت و خواص شیمیایی یون ها
۲. بار و خواص شیمیایی یون ها
۳. غلظت و بار یون ها
۴. فقط بار یون ها

- کدامیک نشان دهنده گستردگی نتایج در اطراف میانگین است؟

۱. صحت ۲. مدد ۳. میانه ۴. انحراف استاندارد

- محلولی نسبت به استیک اسید ۱/۰ فرمال است. غلظت یون OH^- در این محلول چقدر می باشد؟ ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)

۱. $1.3 \times 10^{-3} M$ ۲. $7.5 \times 10^{-12} M$ ۳. $3 \times 10^{-3} M$ ۴. $3.3 \times 10^{-12} M$

- مقدار ۵۰ میلی لیتر نمونه آلومینیوم کلرید تا نقطه پایان با ۱۶ میلی لیتر EDTA، ۰/۱۰۸ مولار سنجیده شده است. جرم آلومینیوم کلرید در نمونه چقدر است؟

(جرم مولکولی آلومینیوم کلرید برابر $133/34$ گرم بر مول است).

۱. ۴/۶۱ گرم ۲. ۳/۲۴ گرم ۳. ۰/۱۰۸ گرم ۴. ۰/۲۳۰ گرم

- کدام آزمون برای مقایسه دقت اندازه گیری ها به کار می رود؟

۱. آزمون $4d$ ۲. آزمون T_n ۳. آزمون F ۴. آزمون Q

- فردی در تجزیه یک نمونه محتوی FeO نتایج زیر را بدست آورده است:

۱۶/۶۵، ۱۶/۶۹، ۱۶/۶۸، ۱۶/۶۱، ۱۶/۵۸، ۱۶/۶۸، ۱۶/۶۵، ۱۶/۶۷ و ۱۶/۶۵

میانه کدام است؟

۱. ۱۶/۶۵ ۲. ۱۶/۵۸ ۳. ۱۶/۶۹ ۴. ۱۶/۶۴

- کدامیک می تواند به عنوان باز لویس باشد؟

۱. Zn^{2+} ۲. CO_2 ۳. BF_3 ۴. H_2O

- کدامیک از نمک های زیر در آب هیدرولیز نشده و حلایت آن تابع pH نیست؟

۱. $PbSO_4$ ۲. $NaCl$ ۳. CaF_2 ۴. $CaCO_3$

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: شیمی تجزیه ۱

و شته تحصیلی/ گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش مخصوص، شیمی (شیمی تجزیه) ۱۱۱۴۰۱۸

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

-۱۰ معادله موازنہ جرم برای محلول محتوی نمک کم محلول $Ca_3(PO_4)_2$ کدام است؟

$$S = \frac{1}{3} [Ca^{2+}] = [PO_4^{3-}] \quad .1$$

$$S = [Ca^{2+}] = \frac{1}{3} [PO_4^{3-}] \quad .2$$

$$S = [Ca^{2+}] = \frac{1}{3} ([CaHPO_4] + [CaPO_4]) \quad .3$$

$$S = \frac{1}{3} [Ca^{2+}] = \frac{1}{2} ([H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + [PO_4^{3-}]) \quad .4$$

-۱۱ کدامیک در مورد اندازه گیری یون Cl^- با $AgNO_3$ توسط روش موهر صحیح است؟

۱. محدودیت این روش، وابستگی آن به pH محلول است.

۲. این روش از جمله روش‌های سنجش معکوس است.

۳. از شناساگر فلوئورسین برای تشخیص نقطه پایان استفاده می‌شود.

۴. کم خطا‌ترین ناحیه در این روش، فاصله بین pH های ۲-۵ است.

-۱۲ در حجم سنجی ۵۰ میلی لیتر محلول 0.05 مولار یون Cl^- توسط محلول 0.05 مولار نقره نیترات، pCl پس از افزایش ۵۰

$$(K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10})$$

۷/۴ . ۴

۴/۸۷ . ۳

۵/۳۳ . ۲

۱/۴۸ . ۱

-۱۳ pH محلول بافری که نسبت به پتانسیم هیدروژن فتالات $3/0$ مولار و نسبت به پتانسیم فتالات $7/0$ مولار است، چقدر می‌باشد؟

$$(K_{a_2} = 3.9 \times 10^{-6} \text{ و } K_{a_1} = 1.1 \times 10^{-3})$$

۲/۵۹ . ۴

۴/۱۸ . ۳

۳/۳۳ . ۲

۵/۷۸ . ۱

-۱۴ pH محلول محتوی 0.01 مولار NaH_2PO_4 جقدر می‌باشد؟

$$(K_{a_3} = 4.8 \times 10^{-13})$$

۷/۲ . ۴

۴/۸ . ۳

۹/۷۲ . ۲

۲/۱۲ . ۱

-۱۵ برای سنجش بازهای ضعیف نظیر آمین‌ها از کدام حلal غیر آبی استفاده می‌شود؟

۴. اتیلن دی آمین

۳. پیریدین

۲. اسید استیک

۱. تتراکلرید کربن

۴. پنتان

۳. بنزن

۲. کلروفرم

۱. الکل

-۱۶ کدامیک یک حلal آمفی پروتیک است؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: شیمی تجزیه ۱

و شته تحصیلی/ گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش مخصوص، شیمی (شیمی تجزیه) ۱۱۱۴۰۱۸

۱۷- کدامیک از لیگاندهای زیر عامل کی لیت ساز است؟

۱. آمونیاک ۲. آب ۳. اتیلن دی آمین ۴. یون سیانید

۱۸- در سنجش ۲۰ میلی لیتر نمونه آب حاوی یون های منیزیم و کلسیم با $EDTA$ ، 0.01 مولار، مقدار $3/2$ میلی لیتر از سنجنده مصرف شده است. سختی کل آب چقدر است؟ (وزن مولکولی $CaCO_3$ برابر 100 گرم بر مول می باشد).

۱. $64\ ppm$ ۲. $160\ ppm$ ۳. $625\ ppm$ ۴. $62/5\ ppm$

۱۹- به 50 میلی لیتر NH_3 ، 0.01 مولار، 30 میلی لیتر هیدروکلریک اسید 0.015 مولار اضافه شده است. pH محلول حاصل چقدر می باشد؟ ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)

۱. $5/42$ ۲. $8/30$ ۳. $10/81$ ۴. $2/34$

۲۰- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سنجش های اسید-باز صحیح است؟

۱. در اسیدها یا بازهای خیلی ضعیف شیب منحنی سنجش بزرگ بوده و تغییر رنگ شناساگر واضح است.
 ۲. هرچه واکنش اسید-باز کاملتر باشد، ارتفاع منحنی در نقطه پایان کمتر است.
 ۳. اگر تغییر رنگ شناساگر در pH مناسب اتفاق نیفتد، خطأ در تعیین نقطه پایان ایجاد می شود.
 ۴. در اسیدها یا بازهای قوی شیب منحنی سنجش کوچک بوده و تغییر رنگ شناساگر واضح نیست.

۲۱- آب برای کدامیک از ترکیبات شیمیایی زیر اثر هم تراز کنندگی دارد؟

۱. اسیدها و بازهای ضعیف ۲. بازهای ضعیف و اسیدهای قوی ۳. اسیدهای ضعیف و بازهای قوی ۴. اسیدها و بازهای قوی

۲۲- کدامیک از شناساگرهای زیر در روش والهارد استفاده می شود؟

۱. یون Fe^{3+} ۲. یون CrO_4^{2-} ۳. فلورسین ۴. بنفس متیل

۲۳- طبقه بندی در شیمی تجزیه بر اساس روش مورد استفاده، شامل کدامیک از دو دسته زیر می باشد؟

۱. شیمیایی و فیزیکی ۲. کلاسیک و دستگاهی
 ۳. نوری و الکتروشیمی ۴. پتانسیل سنجی و الکترولیز

۲۴- کدامیک از روش های جداسازی زیر شامل عبور ماده بین دو فاز مایع و جامد است؟

۱. تقطیر ۲. دیالیز ۳. نفوذ گاز ۴. تعویض یون

۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۰۸:۰۰

کارشناسی و کارشناسی ارشد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): قسطی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسطی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: شیمی تجزیه ۱

و شته تحصیلی/ گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش مخصوص، شیمی (شیمی تجزیه) ۱۱۱۴۰۱۸

۲۵- مرحله اول در فرایند کلی یک تجزیه شیمیایی چیست؟

۱. انتخاب روش

۲. ارزیابی داده ها

۳. نمونه برداری و تهیه نمونه نمایانگر

۴. تجزیه شیمیایی

۲۶- با استفاده از کدامیک از روش های شیمی تجزیه، مقادیر بسیار کم نمونه قابل اندازه گیری است؟

۱. وزن سنجی

۲. روش های نوری

۳. حجم سنجی

۴. الکترووزنی

۲۷- برای تهیه ۵۰۰ میلی لیتر محلول ۰/۰۲۵ مولار یون OH^- ، چند گرم سود لازم است؟ (جرم مولکولی سود برابر ۴۰ گرم برابر مول است).

۱. ۱/۰

۲. ۰/۲۵

۳. ۰/۵

۴. ۱/۲۵

۲۸- فرمالیته محلول محتوی هیدروکلریک اسید با دانسیته ۱/۱۸ گرم بر میلی لیتر و درصد خلوص ۳۶/۵٪ چقدر است؟ (وزن مولکولی اسید برابر ۳۶/۵ گرم بر مول است).

۱. ۱۱/۸

۲. ۱۸/۰۱

۳. ۱۴/۳۶

۴. ۱۳/۶۵

۲۹- رابطه بین وزن هم ارز و وزن مولکولی برای یون MnO_4^- در واکنش زیر کدام است؟
 $5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

۱. وزن مولکولی = وزن هم ارز

۲. (وزن مولکولی) $\frac{1}{2}$ = وزن هم ارز

۳. (وزن مولکولی) $\frac{1}{3}$ = وزن هم ارز

۴. (وزن مولکولی) $\frac{1}{5}$ = وزن هم ارز

۳۰- نمونه ای نسبت به یون آهن، (Fe^{2+})، ppm /۰.۳۴ است. مولاریته این نمونه نسبت به یون آهن چقدر است؟ (وزن مولکولی آهن برابر ۵۶ گرم برابر مول است).

۱. $6.07 \times 10^{-3} M$

۲. $6.07 \times 10^{-6} M$

۳. $3.03 \times 10^{-3} M$

۴. $3.03 \times 10^{-6} M$

۱. $6.07 \times 10^{-3} M$

۳۱- کدامیک از مقایم غلظتی زیر به دما و حجم محلول وابسته نیست؟

۱. فرمالیته

۲. نرمالیته

۳. مولاریته

۴. مولالیته

۱. فرمالیته

۲. نرمالیته

۳. مولاریته

۴. مولالیته

۳۲- کدامیک بیان غلظت بر حسب ppb است؟

۱. $\frac{mg}{ml}$

۲. $\frac{ng}{lit}$

۳. $\frac{ng}{ml}$

۴. $\frac{mg}{lit}$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: شیمی تجزیه ۱

و شته تحصیلی/ گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش مخصوص، شیمی (شیمی تجزیه) ۱۱۱۴۰۱۸

۳۳- در سنجش حجمی اسید-باز، کدام استاندارد اولیه برای سنجش سنجنده $NaOH$ استفاده می شود؟

Na_2CO_3 . ۴

As_2O_3 . ۳

KCl . ۲

KHP . ۱

۳۴- مقدار ۲/۲ گرم از نمک $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ با وزن مولکولی برابر با ۲۲۴ گرم بر مول در ۵۰۰ میلی لیتر آب حل شده است، pBa چقدر است؟

۲/۴ . ۴

۳/۴۲ . ۳

۱/۷ . ۲

۱/۴ . ۱

۳۵- در کدام روش تجزیه وزنی با کمک انرژی حرارتی و یا انرژی شیمیایی، ماده مورد تجزیه اندازه گیری می شود؟

۴. تبخیری

۳. ویژه

۲. رسوب گیری همگن

۱. الکترووزنی

۳۶- چگونه می توان در فرایند رسوب گیری، هسته های درشت تری بدست آورد؟

۲. غلیظ کردن غلظت واکنشگر

۴. کاهش حالیت

۱. کاهش غلظت لحظه ای گونه

۳. افزایش سریع واکنشگر

۳۷- در کدامیک از پدیده های زیر، ناخالصی های در داخل بلور در حال رشد به دام افتاده و سبب آلودگی رسوب می شوند؟

۴. هضم

۳. والختی

۲. احتباس

۱. مندرج

۳۸- جهت اندازه گیری انتخابی یون نیکل، (Ni^{2+})، کدام عامل رسوب دهنده به کار می رود؟

۴. دی متیل گلی اکسیم

۳. نیترون

۲. کوپرون

۱. کوپرون

۳۹- در کدام سنجش رسوبی، از محلول استاندارد تیوسیانات به عنوان سنجنده استفاده می شود؟

۴. فیشر

۳. والهارد

۲. فاجائز

۱. موهر

۴۰- اگر برای سنجش ۱۰ میلی لیتر محلول سود توسط هیدروکلریک اسید ۰/۰۹۴۲ مولار، ۸/۷۵ میلی لیتر اسید مصرف شود، مولاریته سود چقدر است؟

۰/۰۳۸ . ۴

۰/۰۸۲۴ . ۳

۰/۳۸ . ۲

۰/۰۴۲۲ . ۱